




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1245/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1245/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1245/A




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1245/A

1245⁵ A
F. XIV. 8

16

Indice
Medicinal
Campolongo
12
34 B




Æ MILII
CAMPOLONGI
MEDICINAE THEO.
RICÆ IN GYMNASIO

PATAVINO PROFESSORIS LIBER
Vnus

DE ARTHRITIDE
Cui accessit.

Prudentem

ANTONII SNEEBERGERI
TIGVRINI ENVMERATIO ME-
dicamentorum facillè parabilium aduersus omnis
generis articulorum dolores.



Anno Dñi

1622.

• B • D •

Spiræ Nemetum Ciuitatis Imperialis liberæ
Apud Bernardum Albinum.


E. M. L. L.
AMPOLONGI
EDICINAE THEO.
VIC IN GYMNASIO

PATRIBUS THEOLOGICIS LIBER

VOL.

DE ARTHROLOGIA
C. M. L. L.

NOTITIA SNEBBERGER
OVALINI ENVMERATIO
Lecturam facit parabolam adhibet omnia
generis articulationum dolores.



Modi... clastic

Apud Bernardum Albinum
Ginevrae in Civitate Imperiali libere



CA



Cur

an

quid

guy

cur

lan

guy

guy

guy

guy

guy

guy

guy



CAPITVM INDEX



Propositio omnium, de quibus futu-
rus est sermo. Cap. 1. pag. 1.
Quid nomine arthritidis sit intel-
ligendum, & qua sit illius na-
tura. Ca. 2.

Cur dictum sit arthritidem esse tristem sensatio-
nem insuam, & dubitationis cuiusdam so-
lutio. cap. 3. ibid.

Quid per partes sensitiuas articularum intelli-
gendum sit, & cuiusdam dubij solutio. ca. 4. 3.
Cur causa arthritidis statuatur materia redun-
dans, & quid per articularum loca intelli-
gendum sit. cap. 5.

Cur dictum sit in definitione arthritidem partem
affecta vires lacerare, & dictorum omnium e-
pilogus. cap. 6.

Quasi sine scitu necessaria ad exactam explicatio-
nem naturae arthritidis & causarum eius an-
tecedentium. ca. 7.

INDEX

<i>Qua sit materia efficiens arthritidem. ca. 8.</i>	ad ar-
<i>Dubitationis cuiusdam solutio & sententia M. dicorum explicatio. ca. 9.</i>	De differ-
<i>Confutatur Fernelius, qui existimat à pitui- sola oriri arthritidem. ca. 10.</i>	De signa-
<i>Cur materia arthritidem efficiens in locis arti- culorum contineatur. ca. 11.</i>	De signa-
<i>Materiam redundantem arthritidis causam non generari in locis articulorum, sed aliunde suscipi. ca. 12.</i>	De signa-
<i>Cur materia in locis articulorum aliunde susci- piatur. ca. 13.</i>	De signa-
<i>Utrum ad articulos materia paulatim fluat, an confertim. ca. 14.</i>	De signa-
<i>Determino à quo influit humor in articulos. ca. 15.</i>	De signa-
<i>Determino ad quem ipsius fluxionis, & Fernely sententia confutatio. ca. 16.</i>	De signa-
<i>Cur nervi tendinesq; non repleantur, & Erasii opi- nionis confutatio. ca. 17.</i>	De signa-
<i>De spatio per quod confluit humor, & sententia Fernely confutatio. ca. 18.</i>	De signa-
<i>Qua sint causa fluxionis effectrices, tum quomo- do dolor, & calor attrahere dicantur. c. 19. 30</i>	De signa-
<i>Cur in corpore redundet materia. ca. 20. 33</i>	De signa-
<i>Quis aer, quæ item etas, & regio arthritidi pro- ducenda conueniant. ca. 21. 35</i>	De signa-
<i>Quis cibus, & potus, quæq; res aliæ nō naturales ad ar-</i>	De signa-

INDEX

ad arthritidis generationē conferāt. c. 22.	36
De differentijs arthritidis. ca. 23.	38
De signis demonstratiuis arthritidis eiusq; dif- ferentiarum. ca. 24.	40
De signis arthritidis ex necessario consequenti- bus desumptis. ca. 25.	42
De signis arthritidis à causis desumptis. c. 26.	44
Signa locorū in arthritide laborantiū. ca. 27.	46
Signa locorum à quibus ad articulos humores fluere consueuerunt. ca. 28.	48
Cur de signis prognosticis arthritidis in genere omniumq; eius differentiarum sit loquendū; cur item omnis arthritis, vt plurimum dif- ficulter curetur. ca. 29.	49
Signa prognostica differentiarum arthritidis, q̃ à causa formali proficiscuntur. ca. 30.	50
Signa prognostica arthritidis differentiarum, q̃ à causa efficiente capiuntur. ca. 31.	51
De signis prognosticis ischiadis, cuiusdam sentē- tiæ Hippocratis explicatio, explicationis alio- rum confutatio. ca. 32.	53
Signa prognostica podagra, & chiragra. c. 33.	57
De indicatis à dolore, & anodynis distrabenti- bus. ca. 34.	58
De anodynis sensum omnino tollentibus. c. 35.	60
De anodynis sensum minuuntibus, & aequalem reddentibus. ca. 36.	61
Quæ sint anodynorū vera indicātia. ca. 37.	62

INDEX

De remedys praeseruatius. ca. 38.	6
De remedys curatinis. ca. 39.	6
Anodynō sensum reddens aequalē, quatenus talis doloris causam non auferre. ca. 40.	6
De materijs remedium in genere, & venae sectionis tū inuentione, tum quātitate. c. 41.	7
Qua vena in arthriticis secanda. ca. 42.	7
De cucurbitulis, & hirudinibus. ca. 43.	7
De extractione varicum, & earum incisione. cap. 44.	77
De combustionibus. ca. 45.	78
De frictionibus oleo salito administrandis. cap. 46.	81
De materijs pharmaceuticis, & anodynis stupefacientibus. ca. 47.	84
De materijs auxilij anodynī sensum obtundentis, & aequalem naturali sensui reddentis. ca. 48.	86
Quot lenientium genera, tum de vomitorijs atque clysteribus. ca. 49.	88
De umbilicaribus glandibus, aluumq; linientibus per os assumptis. ca. 50.	89
De preparantibus, & purgantibus. ca. 51.	91
De repercutientibus. ca. 52.	93
Eraſti opinio de repercutientium vſu reijcitur. cap. 53.	97
De discutientibus. ca. 54.	100
De mollescentibus valdeq; ſiccantibus. cap. 55.	102

INDEX

De medicamentis extrinsecis morbum ipsum
respicientibus. ca. 56. 104

De medicamentis tam frigida, quàm calida ar-
thritidis intrinsecis. ca. 57. 105

De aere, cibo, & potu. ca. 58. 107

De somno & vigilia, motu, & quiete, excretio-
ne & retentione, animiq; perturbationibus.
Cap. 59. 110

INDICIS CAPITVM FINIS.



INDEX ALPHABETICVS HVIVS LIBRI.



A

- A**ERE, cibo, & potu. 107
de Anodyn non sensum reddens æ-
 qualem quatenus tale, dolo-
 ris causam non asferre. 69
de Anodyn is sensum minuentibus & æqualem
 reddentibus. 61
de Anodyn is sensum omnino tollentibus. 60
de Anodyn is stupefacientibus. 84

C

- de* Cibo & potu. 107
 Confutatur Fernelius, qui existimat à pituita
 sola oriri arthritidem. 12
de Combustionibus. 78
de Cucurbitulis, & hirudinibus. 76
 Cur dictum sit arthritidem esse tristem sensa-
 tionem tensionem, & dubitationis cuiusdam
 solutio. 2
 Cur causa arthritidis statuatur materia redun-

INDEX

*dans, & quid per articulorum, loca intelligē-
dum sit.* 5

*Cur dictum sit in definitione arthritidem par-
tis affecta vires lādere, & dictorum omnium
epilogus.* 6

*Cur materia arthritidem efficiens in locis arti-
culorum contineatur.* 13

*Cur materia in locis articulorum aliunde susci-
piatur.* 19

*Cur nerui tendinesq; non repleantur, & Erasmi
opinionis confutatio.* 27

Cur in corpore redundet materia. 33

*Cur de signis prognosticis arthritidis in gene-
re omniumq; eius differentiarum sit loquen-
dum.* 49

D

*De indicatis à dolore, & anodynis distrahenti-
bus.* 58

de Discutientibus. 100

De differentijs arthritidis. 38

*De signis demonstrativis arthritidis eiusq; dif-
ferentiarum.* 40

*De signis arthritidis ex necessario consequenti-
bus desumptis.* 42

*De spatio per quod confluit humor, & sententia
Fernelij confutatio.* 28

*Dubitationis cuiusdam solutio & sententia me-
dicorum explicatio.* 11

INDEX

E

<i>Erasti opinionis confutatio.</i>	27
<i>Erasti opinio de percussione usu rejicitur.</i>	99
<i>de Exactione varicum, & earum incisione.</i>	77
<i>de Excretionem & retentionem.</i>	110

F

<i>Fernelij sententia confutatio.</i>	24.	& 89
<i>de Frictionibus oleo solito administrandis</i>	81	

G

<i>Galenij contraditione.</i>	32
<i>Galenij sententia, de remedijs praeservatiuis.</i>	64
<i>Galenus de tuenda valetudine 7. podagra negat esse lethalem.</i>	57
<i>Genera lenientium</i>	88
<i>Glandes umbilicales.</i>	89

H

<i>de Hirudinibus & cucurbitulis.</i>	70
---	----

I

<i>de Indicatis a dolore, & anodynis.</i>	58
---	----

L

<i>Lenientium genera.</i>	88
<i>Locus affectus formabilis demonstrat arthritidem.</i>	43

M

<i>Materiam redundantem arthritidis causam non generari in locis articulorum, sed aliam de suscipi.</i>	18
<i>de Materijs remediorum in genere, & venae sectionis.</i>	71
<i>de Materijs auxilij anodynij sensum obtundentis, &</i>	

INDEX

sis, & aequalem naturali sensui reddentis.	86
de Materijs pharmaceuticis, & anodynis stupefacientibus.	84
de Materijs remediorum in genere, & vena sectionis tum inuentione, tum quantitate.	72
de Medicamentis extrinsecis morbum ipsum respicientibus,	104
de Medicamentis tam frigida, quàm calida arthritidis intrinsecis.	105
de Mollientibus & siccantibus.	103
Motus valde difficilis	47
de Motu & quiete	111
O	
Obiecta valde iucunda sunt simpliciter anodyna.	59
de Oleo salito.	81
P	
Pari modo arthritidi calida iungitur insemperies.	68
de Potu & aere.	107
de Præparantibus, & purgantibus	91
Propositio omnium, de quibus futurus est sermo.	1
Q	
Quid nomine arthritidis sit intelligendum, & qua sit illius natura.	3
Quid per partes sensitiuas articulorum intelligendum sit, & cuiusdam dubij solutio.	3
de Quiete & motu.	110
Quæ sint anodynorum vera indicantia.	62

INDEX


<i>Qua vena in arthriticis secanda.</i>	74
<i>Quot lenientium genera, tum de vomitorijs atq; clisteribus.</i>	88
<i>Qua sint scitu necessaria ad exactam explicatio- nem naturae arthritidis & causarum eius an- tecedentium.</i>	7
<i>Qua sit materia efficiens arthritidem.</i>	8
<i>Qua sint causa fluxionis effectrices, tum quomo- do dolor, & calor attrahere dicantur.</i>	30
<i>Quis aer, qua itemetas, & regio arthritidi pro- ducenda conueniant.</i>	35
<i>Quis cibus, & potus, quaque res alia non natu- rales ad arthritidis generationē conferāt.</i>	36
<i>R</i>	
<i>de Remedys praeseruatius.</i>	63
<i>de Remedys curatiuis.</i>	66
<i>de Remedys praeseruatius. 64. & curatiuis.</i>	66
<i>de Repercutientibus.</i>	93
<i>de Retentione & excretionē.</i>	119
<i>S</i>	
<i>de Siccantibus & mollientibus.</i>	102
<i>Signa prognostica podagrae, & chiragrae.</i>	57
<i>de Signis prognosticis arthritidis in genere.</i>	49
<i>Signa prognostica differentiarum arthritidis, quae à causa formali proficiunt.</i>	50
<i>Signa prognostica arthritidis differentiarum, quae à causa efficiente capiuntur.</i>	51
<i>de Signis prognosticis ischiadis, cuiusdam sen- tentiae</i>	


INDEX


<i>sententia Hippocratis explicatio, & explicatio-</i> <i>nis aliorum confutatio.</i>	53
<i>Signa locorum in arthritide laborantium.</i>	46
<i>Signa locorum à quibus ad articulos humores</i> <i>fluere consueverunt.</i>	48
<i>de Signis arthritidis à causis desumptis.</i>	44
<i>de Somno & vigilia, motu, & quiete</i>	110
T	
<i>de Terminò à quo influit humor in articulos.</i>	22
<i>de Terminò ad quem ipsius fluxionis, & Fernely</i> <i>sententia confutatio.</i>	24
V	
<i>qua Vena in arthriticis secanda</i>	74
<i>de Vigilia, motu, & quiete.</i>	110
<i>de Umbilicaribus glandibus, aluumq; linienti-</i> <i>bis per os assumptis.</i>	89
<i>de Umbilicaribus glandibus.</i>	89
<i>Vtrum ad articulos materia paulatim fluat, an</i> <i>confertim.</i>	21
<i>Vrina flava.</i>	44

FINIS.









EMILII CAMPOLONGI
DE ARTHRITIDE
LIBER.



*Propositio omnium, de quibus futurus est sermo.
Cap. Primum.*

DE Arthritide verba facturus, tria
cenſeo eſſe conſideranda. Primum
eſt natura indicantium omnium
ad arthritidem attinentium; alte-
rum, quæ ſint auxilia, auxiliorumq;
materiæ, & rectus uſus; tertium, quænam ſit le-
bendum articulos affectos medicamento cuiuſq;
compoſiti neceſſitas. Quod verò melius quod pri-
mo loco duxi pertractandum, explicetur, primum
arthritidis definitionem in medium afferam, de-
inde omnes illius cauſas atque differentias, mox
arthritidis ſigna demonſtratiua, eiſq; differen-
tiarum, tandem etiam prognſtica.

*Quid nomine Arthritidis ſit intelligendum, & quæ ſit illius
natura. Cap. 2.*

Definitioni autem quoniam nominis inter-
pretatio recte præmittitur, arthritidem dici-
mus à læſa particula nomen ſumpſiſſe, quaſi arti-
culorum affectum, teſte Gal. 2. Meth. 2. De eius
erò exiſtentia, cauſaq; exiſtentia, non eſt quod
poſquamur, cum conſtet nunc affectum reperiri,
ex velut præter naturam nullius finis gratia eſſe
genitū. Accedentes igitur ad ipſius definitionem,
Arthritidem definimus triſtem ſenſationem ren-

DE ARTHRITIDE

suam partium, quæ articulis proxima sint, seu
in tactus præditarum, ex redundante materia in
locis articulorum existēte profectam, & partium
affectarum vires lædentem.

*Cur dictum sit arthritidem esse tristē sensationem tensi-
uam, & dubitationis cuiusdam solutio. Cap. 3.*

NON abs re superiore Capite dicta est arthritidis
sensatio tum tristis, tum tensiua: tristis, quia
omnis dolor tristis sensatio: tensiua, quia ex sen-
tentia Galeni, Aetij & Pauli non gignitur hic af-
fectus, nisi confluat materia redūdās, quæ repleat
loca articulorum, ad quorum repletionem par-
tes sensitiuæ distendantur. hinc enim solutio vni-
tatis exoritur, & dolor, qui dicitur arthritidis. hic
arthritidis ortus, hæc origo: nil ergo mirum si ar-
thritidem statuamus dolorem tensiuum, seu tri-
stem sensationem tensiuam. Verum occurrit hoc
loco dubitatio, nam Gal. 3. Aphor. ult. dolores ar-
ticulorum inquit prouenire ex instrumentorum
quæ natura fabricauit ad articulorū motionem
frigiditate. Hippocrates verò 3. aphor. 16. in siccita-
tibus dolores articulorum contingere docet
cuius rei Galenus in Com. reddens rationem in
hæc verba prorumpit: si enim immodicæ tempo-
rum siccitates consumpserint articulorum humi-
ditatem, difficilem motum & siccitatem efficiēt
fortè verò, & nonnunquam dolorem. Præterea
dolor ex vulnere vsque ad articulum articuli do-
lor existit, cum tamen nullus ex propositis tensi-
uus dici queat, siue ex intemperie frigida aut sic-
ca, siue ex vulnere proueniat. Galenus in Com.
prædi-

LIBER.

prædicti Aphor. 16. tertiæ particule inquit, do-
 rem articulorum à siccitate propriè arthritide a-
 fecti non debere, nisi quis omnem dolorem arti-
 culorum arthritidē velit appellare. ex quibus ver-
 bis colligo arthritidē duobus modis capi posse nē-
 ce cōiter pro quocunq; dolore articulorum, &
 propriè pro dolore articulorū ex materie redu-
 ctantia, quo modo passim accipitur à Galeno, præ-
 cipuè verò decimo de comp. medicamentorū se-
 cundum loca cap. 2. dolor articularis priore mo-
 do consideratus non est tensiuus; posteriore ve-
 rò, quemadmodum in præsentia sumitur, tristis
 ensatio tensiua dicendus est.

*Quid per partes sensitiuas articulorum intelligendum sit, &
 cuiusdam dubij solutio. Cap. 4.*

Partium sentientium articulis proximarū no-
 mine, quarum dolorem Arthritidem nuacu-
 amus, cum Gal. 6. Aphor. 49. in audiendi sunt
 nerui & tendines, nec non cum eodē 2. de locis aff.
 1. membranæ articulis contiguæ: nerui enim &
 tendines quamuis nō repleantur, cū articulatio-
 nibus tamen extenduntur; membranæ verò tum
 repleantur, tum extenduntur. in eo tamen hæc tria
 partium genera conueniunt, quod dolorem sus-
 cipiant: ossa verò, cum sensus sint expertia, vt vo-
 luit Aristor. 2. de partibus animal. cap. 9. & Gale-
 nus 16. de usu partium 2. dolorē suscipere neque-
 unt. Vnde credidit Areræus secundo de morbis
 diuturnis capite 12. ossa non esse in hoc affectu ab
 omni dolore libera, putandum est ipsum non ac-
 cepisse ossa à periostijs seiuncta, sed iisdem inuo-

A

luta. hoc enim modo nemo negauerit ossa dolere rem pati, cum tamen verè patiantur arthritidem partes solæ sensitiuæ articulis proximæ. Nomine articuli intelligenda est ossium connexionio, vel ipsa pars profunda ossis quæ connectitur cum cana; veluti docuit Gal. ex sententia Hippoc. de artic. 1. & lib. de ossibus cap. 1. Ex iis quæ iam dicta sunt quæsierit fortasse aliquis, cur nam arthritidis, quam dolorem diximus membranarum tendinum & neruorum, Medicis vocetur dolor articulorum? Nos verò hoc inde prouenire affirmamus, quod doloris nomine nonnunquam doloris causa, non tristis sensatio intelligatur, in hac enim significatione ipse Gal. dolorem accepit 2. de compos. medicamentorum secundum loca. 2. vbi dolorem perferre cerebri substantiam affirmat, quam tamen constat, vtpote sensus expertem, doloris non esse capacem. similiter neque articuli, siue pro ossium extremitatibus, siue pro ipsorum connexionibus accepti verè doleant quippe qui omni sensu carent; sed quemadmodum ipsa cerebri substantia non rarò doloris causam in se continet, ita & articuli; qua ratione licet minus propria cerebri substantia, & articuli dolere dicantur, doloris enim nomine sæpe doloris causam significari patet ad Hippoc. apud Gal. 2. aphor. 6. Proprius itaque dicitur articularis dolor partium sentientium articulis proximarum quoniam aliarum partium sentientium arthritidis dolor non existit.

ur causæ arthritidis statuatur materia redundans, & quid per articulum loca intelligendum sit. Cap. 5.

Ausa ex qua arthritidis producitur, est materia redundans, de qua postea sermo fiet. nunc vero illud nosse satis sit, arthritidem propriè sumptâ ac vna causâ ab omni alio dolore articulari distinguui ac separari, id quod neutiquam fieret, si unitatis solutio arthritidis causâ constituta foret. Nam ab unitatis solutione nullus non dolor, neque articularis pendet. Accedit quod nobis vixim est proponere causam remedijs indigentem, cuiusmodi est non solutio unitatis, sed materia redundans. quinimo inter materiam & dolorē non modo solutio unitatis intercedit, verum etiâ tensio. à materia enim redundante tensio, à tensione solutio unitatis, à solutione deniq; unitatis dolor proficiscitur. Nos tamen non modo solutionem unitatis prætermittere maluimus, quàm arthritidis causam assignare, sed etiam tensionem, quia cū tensio sit magnitudo aucta ex materia tendente, est quidem ea ex numero illorum affectuū, quos proposuit Gal. 1. de locis aff. 2. dicens nonnullos articulari morbos adeò soluti faciles, vt ad ablationem causæ efficientis, velut umbra ad ablationē corporis tollantur. Cum igitur tensio & unitatis solutio, quæ sunt causæ mediæ inter materiam tendentem, & dolorem, auferantur ad ablationem causæ efficientis; propterea in mediū allata causâ vtilia indicante, diximus fieri arthritidem à materia redundante, quæ quidem reperitur in locis articulum. hæc porro articulum loca, vt pau-

DE ARTHRITIDE

Id inferius veterum auctoritate rationeq; comprobabimus, sunt ligamenta, membranula ossium extremitates cingentes, atq; articulorum cauitates, nō autem nerui aut tendines. in his siquidem materia si redundet, fiet vtrique teste Galeno 6. aphor. 49. in arthritide conuulsio; quam tamē experientia docet nunquā in arthriticum cadere.

Cur dictū sit in definitione arthritidem partis affectae vires lādere, & auctorum omnium epilogus. Cap. 6.

Quoniam arthritidis duobus modis considerari potest, vel vt symptoma, vel vt causa; hactenus verō tradita est natura arthritidis sub ratione symptomatis; reliquum est, vt eiusdem, quatenus causa rationem obtinet, definitio proponatur. Dicimus itaq; arthritidē partis affectae lādere vires, qm̄ in causa est vt frustrata suis virib⁹ natura facultate deprauata fiat attractio, vt postea demonstrabitur, prāterea etiā vt diminuta succedat nutritio, adeo vt dixerit Hipp. 6. aphor. vlt. partes affectas contabescere. ad hēc ex arthritide motus prāter naturam ortum trahit, quoniam dum arthritici membrum affectum mouere tentant, dolor eorum augetur, quo fit vt subsistere cogantur. Quamuis autem auctore Gal. vt docuit primo arthritidis curatiua ad Glauc. 14. ex dolore articulorum proueniant Syncopae, & vigilia; ideoq; facultates cordis & cerebri frustrentur suo munere; quia tamen hēc ex quacunq; arthritide non succedunt symptomata, sed ex vehementissima duntaxat, prāterea dictum est ab arthritide lēdi vires partis affectae, aliarum partium non item. Ex ijs, quae di-

sunt, liquet, in definitione arthritidis iam tra-
 ta contineri causam formalem, materialem, &
 efficientem. duplex est autem eius forma: quate-
 nis enim symptoma, est tristis sensatio tensiva;
 itemus causæ, lædens vires. duplex similiter in
 definitione apparet causa materialis, nēpe for-
 mæ, & efficientis causæ: residet enim tristis sensa-
 tio tensiva in partibus sentientibus articulis pro-
 nis; & causæ efficiens arthritidem, quæ est ma-
 teriæ redundantia, non solum aliquando reperit-
 ur sub periostijs, sed sæpe etiam in alijs locis arti-
 culorum non sentientibus; quæ quidem loca cum
 impleat distendatq; efficit ut vna distendatur ner-
 vi, & tendines. quare Paulus libro 3. de medica-
 mente 78. optimè statuit nervos, & tendines affi-
 ci per consensum positivum, nā ex sententia Gal.
 aph. 49. colligit ad extensionem aliarum partiū
 extendi nervos, & tendines, quamvis, ut postea
 clarius apparebit, non solum nervi & tendi-
 nes, sed interdum quoque ligamenta per consen-
 sum positivum afficiantur.

*Quæ sint scitu necessaria ad exactam explicationem naturæ
 arthritidis, & causarum eius antecedentium. Cap. 7.*

QUOD accuratius percipiatur arthritidis natura
 causæque illius antecedentes, cognitu ne-
 cessaria est materia extendēs arthritidis procrea-
 trix: ea verò quoniam non extenderet, nisi in locis
 articulorum contineretur, propterea secundo lo-
 co sciendum est, cur in eis detineatur; & quia ma-
 teria in propositis locis non contineretur, nisi in-
 quibus eius fieret generatio, aut receptio, propterea

tertio loco inquiremus vtrum in locis articu'orū generetur, an potius ibi recipiatur: constabit autē recipi: ideoque quarto loco rationem reddemus, cur recipiatur: & quoniam non reciperetur, nisi confluere, idcirco peruestigabimus confertimine, an paulatim confluat: deniq; ostendemus confertim confluere: ad quem modum efficiendum præter mobile requiruntur terminus à quo, terminus ad quem, via per quam fiat motus, & mouēs ipsum. hinc nobis incumbet ex officio docere, quisnam sit terminus à quo, quis terminus ad quē, quod spaciū ipsius motus, à quo inā motore fiat fluxio attrahentene, an transmittente; rādem quænam sint causæ attractionis, & transmissionis, quia verò non confluere materia redundans attracta, aut transmissa, nisi in corpore reperiretur; ideo ad extremum patefaciemus, cur redundans materia in corpore reperiat. decem igitur hæc capita quo ordine proposuimus, discutiem⁹.

Quæ sit materia efficiens arthritidem. Cap. 8.

QUod attinet ad materiam arthritidis efficiētem Gal. 10. de comp. med. secundum loca ca. 2. dicit Arthritidem quandoq; fieri à sanguine, plerumq; verò à pituita, quæ temporis progressu crassior, & viscosior effecta, demum in tophos conuertitur: præterea à bilioso humore permisto quandoq; cum pituita, quandoq; cū sanguine. Ex quibus verbis Trincauellius vir doctissimus colligere ausus est, ex bile syncera non posse arthritidem produci, quòd Galenus eam asserat à bile interdum permista cum sanguine, interdum cum

im pituita procreari. quam ipsius sententiam sic
 fieri conatur; bilis est humor tenuis, quare ten-
 ens ad partes cutaneas arthritidem efficere ne-
 uir, propterea quod, ut gignatur arthritidis, neces-
 est ut humor ad partes internas, loca videlicet
 articulorum, fluat & ibi quoque detineatur. Recē-
 tiorum vir quidam clarissimus hanc Trineauellij
 sententiam hoc unico argumento fulcire nititur:
 bilis est humor acris, ergo si redundet, non arthri-
 tidis tumores, sed vlcera efficiet. Verum hæc sen-
 tentia aduersatur sententiæ Auicennæ, Rasis, Ae-
 lij, & Pauli; addo etiā rationi, quo minus mirum,
 neque ex verbis Galeni colligi vlla ratione pos-
 sit. Auicennas lib. 3. fen. 22. trac. 2. capite 5. dicit ar-
 thritidem quandoque produci à syncera bile: eius
 verò sic productæ cap. 6. signa proponit. Rases scri-
 bit hunc effectum raro à bile, rarissimè à melan-
 cholia fieri. Actius sermone quarti, tertij tetr. ca-
 pite. 15. proponit signa arthritidis biliosæ, & cap.
 8. eius curationem in medium adducit. idē etiam
 Paulus lib. 3. de re medica cap. 78. facere videtur.
 Aduersatur porro hæc illorum sententia rationi.
 si enim arthritidē biliosus humor præ sua tenui-
 tate producere non posset, multo minus flatus ut-
 potè bile longè tenuior id præstiterit. Auicennas
 tamē capite sexto superius citato dicit arthritidē
 quandoque fieri à flatu; eiusque sic productæ propo-
 nit curationem. Præterea experientia est cōpro-
 batum à syncera bile fieri affectus arthritide ma-
 gis internos, cuiusmodi sunt pleuritis atque phre-
 nitis; quid igitur prohibet, quo minus arthritidis

itidem ipsa à bile syncera procreetur. Insuper ut
 bile syncera tenui nequeat arthritidis fieri, at fiet
 crassa bile, qualis est vitellina Græcorum, quæ ob
 vehementem calorem secundum partes tenues et
 consumpta, crassitie quidē & colore vitellis ouo-
 rum si nullima. Adde quod ex Gal. verbis loco ci-
 tato non potest colligi arthritidem ex syncera bi-
 le non fieri: quinimo cum eodemmet auctore 3.
 aphor. 16. arthritidis fiat ab humorib⁹ acris, val-
 deq; calidis, putandum significare voluisse Gale-
 num biliosos humores synceros potius, quā per-
 mistos, præsertim cum eorundem purgationem
 proponere videatur, libro quos, quando purg. o-
 portet, &c. dicens articulorum dolores, si multo
 cum calore in festent, purgatione bilis amaræ in-
 digere. Quod si ex verbis Galeni 10. de comp. se-
 cundum loca cap. 2. colligamus arthritidem non
 fieri à syncera bile, pariter inde esset colligendum,
 hunc affectum non fieri à syncera melancholia.
 quemadmodum enim de arthritide à bile syncera
 non loquitur ibi Galenus, ita neq; de eodem vi-
 tio à melancholia syncera producto verbū vllam
 facit. Aetius tamen huius proposuit signa capite.
 17. & curationē capite. 34. Paulus etiam & Arabes
 de hac arthritide locuti sunt. Constat igitur Trin-
 cauellij sententiam esse reiiciendam; eiusq; defen-
 soris rationem solutu esse facilem. nam quamuis
 bilis sit humor acris, non tamen semper vlcerā
 produci; imò iterum citra vllam exulcerationem
 producere cōsuevit. quippe ad vlceris generatio-
 nem requiritur non tantum humor valde acris;

led

Id etiam qui agat in partem vlceri generando i-
 ont am, cuiusmodi nulla est partium articulis
 proximarum quodd hæ omnes duræ sint atq; ter-
 res tenues & stris substantiæ, ægreq; admodum ab humore
 exulcerentur; Concludamus itaq; ab omnib.
 humoribus syneetis fieri posse arthritidem; ita in
 Rasles optime existimauerit eandem plerunq;
 fieri à pituita, sæpe à sanguine, raro à bile, rarissi-
 nè à melancholia. Ex omnium præterea senten-
 tia ab humoribus permistis arthritidis fieri cõsue-
 rit: quoniam verò ex humoribus velut funda-
 mento eleuantur vapores, ideo Auicennas capi-
 te superius citato arthritidis à flatu proponit si-
 gna & curationem.

*Dubitationis causam solutio, & sententia medicorum ex-
 plicatio. Cap. 9.*

QUæ superiore capite constituta sunt, videntur
 etiamnum in controuersiam vocati posse,
 magnus enim Hippoc. 6. aph. 49. & cum eo Gal.
 in commento, præterea Aetius Sermone 4. tertij
 tetr. c. 7. dicunt arthritidem fieri ab inflammatio-
 ne. quod si verum, consequens erit, huius affectus
 causam esse dumtaxat sanguinem: inflammatio
 namq; ex Galeni sententia lib. de diff. morb. c. 12.
 à sanguine ortum ducit. Hanc nos dubitationem
 ut è medio tollamus, dicimus inflammationem
 quandoq; capi pro tumore calido, renitente, do-
 lorifico, qui ex Galeni sententia citato loco fit tã-
 tum à sanguine. quandoq; pro omni tumore cali-
 do, quemadmodum accepit Galenus inflamma-
 tionem lib. de cõstitutione artis medicæ capite 15.

vbi pleuritidē esse inflammationem à sanguine, bile, pituita, vel etiam melancholia genitam pronunciauit. hac posterior acceptio medicis veteribus frequens est, qua intelligunt per inflammationem tumorem omnem calidum, non autem à sanguine solo genitum. si quis autem neget pituitam tumorem calidum posse efficere, verum id quidem est, si per se non efficere putetur: verū ex accidenti nihil obstat, quo minus tumorem calidū producat; id quod accidit, quando in locis articulorum detinetur: ibidem enim incalescit, articularemq; dolorem excitans, in causa est, vt fiat attractio humoris tenuis calidiq; . statutum igitur sit non tantum à sanguine, sed ab alijs humoribus, nec non à flatibus arthritidem procreari.

Confutatur Fernelius, qui existimat à pituita sola oriri arthritidem. Cap. 10.

Ceterum Fernelius lib. 6. suę pathologię vbi de Arthritide tractat, apertè asserit, eā neq; fieri à sanguine, neq; à bile, neque à melancholia, sed duntaxat, à frigido, & pituitoso humore; gloriaturq; se rationis vi, artisq; vsu, huius sententię auctorem extitisse. Eius tamen opinioni (pace tanti viri dixerim) non modo cuncta medicorum schola reclamationat, verum etiam ratio ipsa, atq; adeo experientia reluctatur. Galenus enim 10. de cōpos. medic. secundum loca ca. 2. ex sola sanguinis euacuatione quandam speciem arthritidis sublatam testatur; quam proinde sequitur à sanguine ortū traxisse. Testis est etiam experientia, ruborē persæpe in parte dolente conspici, & caliditatem vehementē.

mentissimam perferri; quocirca rationi con-
genitum est, hanc arthritidem ab humore san-
guineo produci. Huic obiectioni respondere co-
natur Fernelius, dicens fieri quidem arthritidem
non solum humore pituitoso, vel seroso; ruborem
vero, & calorem, qui interdum, maximeq; in chi-
ragra, vel podagra cernitur non à morbi causa, sed
doloris vehementia proficisci, qui nonnunquam
etiam febrē accersit. Quæ Fernelij responsio si es-
set vera, dum in extremis partibus tumor est eui-
dens, calidus & ruber, sequeretur tū dolorem ar-
ticularem esse vehementem, siquidem voluit tu-
morem euidentem, rubentē & calidum fieri à do-
loris vehementia. Sequeretur & illud, quod vehe-
mentior dolor fuerit, eò maiorem tumorem, ru-
borem, & calorem fore; quod quàm sit experi-
entia contrarium, nemini est obscurum. Frequē-
tissime enim experientia est cōprobatum dolores
articulares tunc remissiores euadere, quando ru-
bores, siue rubentes & calidi, siue alterius tem-
peramenti, fuerint valde euidentes: cuius rei ca-
usa ratio reddi potest, quòd materia, quæ prius loca
articulorum obsederat, iam ad partes externas
propellitur, ac postmodum discutitur. Docet ite-
dem experientia, in chiragra, vel podagra venas
proximarum partium tumidas & rubentes reddi,
illa verò genita & adaucta tumorem & ruborem
venarum euanescere. quocirca pro certo habendu-
m, ad loca arthritide correpta confluxisse san-
guinem, qui tumidas atq; rubentes venas proxi-
mas effecerit. Ad hæc si pars arthritide detēta ple-

runq; est alba, sæpe rubra, rarò flava, rarissimè nigra: cur non erit omnium ex consensu asserendū arthritidem frequentissime esse pituitosam, frequentè sanguineam, rarò biliosam, & nonnunquam melancholicam? Siquidem ex differentiis coloris diversæ arthritidis species innotescunt, uti infra demonstrabitur. Tradit & illud experientia, dolorem articulare, & si continuum, aliquando tamen esse uniformem, hoc est, à principio ad finem æquali vehementia perdurare: aliquando per intervalla incrementum atq; augeri, idq; vel singulis diebus, vel alternis, vel etiam quarto quoq; die: quæ res fidem facit arthritidem non modo à pituita, sed etiam ab alijs humoribus originē ducere. De pituita illud superest, ut dicamus, ex recentioribus nonnullos existimasse à sincera pituita nunquam arthritidem generari; quam sententiam, licet erroneam, ratione, & auctoritate velle videntur confirmare. ratione quidem ista: pituita est humor crassus, igitur arthritidem efficere non potest; quandoquidem hic affectus humoris affluxum ad loca articulorum expostulat; crassus autem humor sincerus confluere non potest, quare indiget, ut permisceatur cū tenui, qui vehiculi vicem gerat. Hippocratis quoque auctoritati inniti se putant, qui libro de affectionibus sub medium, fieri arthritidem ex pituita cum bile mista affirmat. Verum hac eorum post habitam sententia, ut quæ longè à veritate abhorreat, rationi atq; auctoritati, qua se tuentur, sic putamus nullo negotio posse responderi. Avicennas pri-

ma

ia Fen. primi libri doctrina quarta capite primo
 ter alias species pituitæ auctor est aqueam re-
 eriri, quæ fluxionibus est perquam familiaris. id
 verum, ut est verissimum, falsum hoc, omnem
 tuitā esse crassam: aquea enim adeo tenuis est,
 fluxilis sit ipsa per se, citra ullius vehiculi adiu-
 uetum, arthritidemq; efficiat. Hippocrates por-
 o loco citato locutus est de arthritide modo v-
 um articulum, modo alium inuadente; quæ sit
 o humore tenuissimo varias identidem partes
 erreptante: qualis humor dici nequit pituita syn-
 era, sed quæ sola cum tenuissima bile commi-
 ere. Non est igitur intelligenda sententia Hip-
 ocratis de omni arthritide, cum præsertim dicat
 Gal. 10. de compos. secundum loca cap. 2. dari etiā
 arthritidem à syncera pituita productam.

*Ca. Materia arthritidem efficiens in locis articularum
 contineatur Cap. 11.*

Nisi humor superabundans contineretur in
 locis articularum, proculdubio arthritidem
 non efficeret. nunc verò qua de causa in eis deti-
 neatur inquirētes, dicimus materiam plus æquo
 retentam esse opus deprauatæ retentionis: retē-
 tionem autem deprauatam reddi, maioremque
 quàm pro naturali statu, ob frustrationem facul-
 tatis retentricis, quemadmodum enim causa cō-
 coctionis læsæ est frustratio facultatis concoctri-
 cis iuxta Gal. sententiam 3. de sympt. causis ca. pri-
 mo, ita frustratio retentricis est causa retentionis
 præter naturam. Frustratur retentrix facultas bi-
 triā, mediātē, vel immediātē, mediātē quidem,

quando diminuta, aut plane abolita est expulsio
 immediate ob externum errorem, aut laesam fa-
 cultatem retentricem, quemadmodum quoque
 Galen. 3. de symp. causis cap. 1. alteratricem facul-
 tatem ventriculi frustrari vel ob externum erro-
 rem, vel ob ipsius facultatibus laesionem asseruit.
 Error externis est obiectum nullam habens cum
 facultate expultrice proportionem. in arthritide
 namque ob crassitiem, & visciditatem materiæ arti-
 culorum retentrix depravatè agit. quamobrem
 Gal. 10. de comp. secundum loca cap. 2. inquit ar-
 thritidem aliquando fieri ex pituita instar puri
 incrassata, quæ ubi in articulis diutius in federit,
 præter crassitiem visciditatem quandam adipisci-
 tur, tandemq; in tophos, seu callos conuertitur.
 Virtutis retentricis læsio substantiæ suæ vitio cõ-
 tingit seu ob morbum in intemperie sicca; ob quod
 morbum Hippocrates 6. aph. ultimo inquit in
 diuturnis doloribus coxendicis crura contabescere;
 ex siccitate enim partium articulis proximarum
 adeo labefactatur earundem facultas, vt diuturnior
 quam par sit, fiat retentio: haud aliter quàm in cor-
 poribus siccis & duris diutius figuræ conseruan-
 tur impressæ, quàm in humidis & mollibus: verum
 hæc sic accipi nolim, quasi intemperies sicca omni
 ni arthritidi sit annexa: confirmata quidè est per-
 petua, alijs non item. nam vt cõstabit infra, in ini-
 tio arthritidis, articulorum loca laborant potius
 intemperie humida, & morbo in raritate, quàm
 intemperie sicca; dum præsertim dispositio par-
 tium suscipientium humores in illis duobus con-

stat, non in siccitate. Siccitas itaq; dolores articulari-
lares iam inueteratos comitatur; siccitatē lon-
dum quoque retentio, quā naturalis status patiatur. Quod
truncatam, vel abolitam expulsionem fru-
etur retentrix, eiusq; actio deprauetur, id ascri-
ndum est materiae superabundanti, quæ omni
thritidi communis, facultati expultrici adeo in-
modat, ut ab ea vix, aut ne vix quidem expel-
possit. Eodem quoque modo tumor ex eadem
ateria genitus expultricem articulorum facul-
tem adeo infestat, ut partes illis proximas secū-
natur naturam adstringi, materiamq; redundantē
pelli non permittat. Morbus item in meatu &
cavitatē facultati expultrici impedimento est. ta-
m morbum iudicamus non modo obstructio-
nem, sed etiam adstrictionem: illa in arthritide ex
mixtione humorum per venas, ut infra planum fi-
nquitur, provenire solet: hæc verò duplex existit, com-
pressio nempe, & densitas; quarum prior in om-
arthritide ex tumore & materia redundante
ascitur; posterior, ubi tantum frigidi exuberant
mores, intemperiesq; admodum frigida ab ipsa
introducitur. Cuiuscunque autem morbi vi
adstrictione aut obstructione consistentis, di-
minuta, vel abolita, redditur expulsio. nequit e-
um facultas expultrix suum munus obire, nisi
neatus, per quos fiat expulsio, referati seruentur.
morbo autem in cavitatē quanquam impedia-
ur, facultas expultrix, is tamen in arthritide sem-
per non reperitur, sed duntaxat, ubi ex confluxu
ateriae ad articulorum cavitatem prodierit,

B

veluti postea demonstrabimus. Colligamus nunc
 responsionem ad quaestionem propositam, cum
 nam redundans materia in locis articularum plus
 iusto detineatur: id autem fieri asseueramus, quia
 in omni arthritide diminuta vel abolita efficitur
 expulsio propter morbum in magnitudine aucta
 vel in compressione, & ob eiorum externum, qui
 in materiae consistit redundantia. Accedit quod
 longior sit retentio, quam par sit, nonnunquam
 propter humoris crassitiem, & visciditatem, non
 nunquam ob intemperiem siccam; aliquando etiam
 propter obstructionem, à qua, diminuta, vel abo-
 lita expulsionem, deprauatur quoque retentio; id
 quod ob densitatem etiam fieri assolet, nec non ob
 repletionem cauitatis, à qua dum impeditur arti-
 culorum motus, materiae quoque redundantiae
 retentio praeter naturam subsequitur.

*Materiam redundantem arthritidis causam non generat
 in locis articularum, sed aliunde suscipi. Cap. 12.*

GAL. 10. de comp. secundum loca c. 2. docet ad
 efficiendam arthritidem necessarium esse hu-
 morum affluxum ad loca articularum. quam sen-
 tentiam repetit 6. aphor. 49. Aetius verò 6. te-
 trab. sermone 4. cap. 6. ad efficiendum arthritidem
 praeter articularum imbecillitatem concurrere
 quoque humoris fluxionem asseueravit. Paulus
 libr. 3. cap. 78. hoc idem confirmat, atque ut vno
 verbo dicam, neque singulis recensendis immo-
 rer, ex omnium medicorum constat sententia, ma-
 teriam arthritidis causam effectricem in locis ar-
 ticularum non generari, sed aliunde suscipi. Quod
 si quis

quis quæ fuerit, cur materia in locis articulorum
 unita arthriti esse non efficiat: respondemus hanc
 materiam non modo paulatim generari, sed
 iam postmodum ad partes externas propelli;
 quibus inhærens, articularis doloris causa esse
 non potest, quod hic confertim fieri soleat, idque
 materia plus æquo in articulationibus detenta.

materia in locis articulorum aliunde suscipitur. Cap. 3.

Materia aliunde transmissa suscipitur in locis
 articulorum non tam propter ipsius fluxio-
 nem, quam partium suscipientium imbecillita-
 tem, quemadmodum facile est colligere ex Gal. 6.
 mor. 28. Hæc porro imbecillitas, ut testatur A-
 vicennas libr. 3. fen. 22. tract. 2. cap. 5. in principio
 nihil aliud est, quam articulorum nimia raritas,
 siccitas, humiditas. Nam quemadmodum glandu-
 larum partes facile fluentes humores suscipiunt,
 ita etiam à natura humidæ, laxæ, & ratæ produ-
 ci sunt; ita, inquit Avicennas, articuli imbecil-
 les, & proinde humidi, laxi, & rari, ad humoris
 abundantis susceptionem sunt aptissimi; contra-
 riò parum apti, quorum contraria est constitu-
 tio. Verum hæc articulorum imbecillitas non est
 morboſa constitutio, cum articulorum
 totum neutiquam labefactet, sed ei læsionem in-
 ire possit, antequam articulorum dolor succe-
 dat. Dubitauerit fortasse aliquis, quomodo imbecil-
 litas fluxionis humorum ad articulos, articu-
 lorumque, doloris possit esse causa; quod tum ma-
 ximo correpti doloribus articulorum obnoxii
 non viderentur, propterea quod in articulis eorum

partibusque proximis macies inest, non autem humiditas, laxitas, & raritas reperiuntur, cum tamen experientia testimonio non defuerint, qui marasmo simul & arthritide laborauerint. Non verò huic dubitationi occurrèdum sic putamus corpora quantumlibet emaciata humiditatibus alimentalibus quidem destitui, excrementarijs tamen posse abundare; qua ratione non erit mirandum, si humida secundum articulos partesque proximae, laxa, & rara censeantur, ac propterea etiam ad aliorum excrementorum receptionem, à qua proficiscitur arthritis, idonea. Constat igitur arthritidis generationem necessariam esse articulorum, partiumque proximè adiacentiū imbecillitatem. Sit ne imbecillitas hæc nativa, an acquisitiva, paulò inferius elucescet. Suffecerit in presentia non ignorare, quamuis nobis fuerit ingenuita, non tamen statim ab ortu nostro sese prodere. unde verissimum illud Hippocratis 6. aphor. 30. pueri podagra non laborant, quanquam enim horum aliqui imbecilles articulos à natiuitate sortiti sunt, cum tamen præter imbecillitatem à efficiendam arthritidem requirantur redundare humores, idcirco pueri arthritide non corripiuntur, quoniam plurimum habent calidi innati à quo redundans humor consumitur. qua ratione adductus Galenus liberè pronuntiauit se nunquam pueros arthriticos vidisse. nihilominus si plus crudtatis accumulet alicuius ingluuies, quàm possit calor natiuus conficere; quid vetat, quin idem etiam puer arthritide infestetur?

Vini

Utrum ad articulos materia paulatim fluat, an confertim. Cap. 14

¶ Vm haecenus constet fieri arthritidem ex fluxione materiae ad articulos; modò sciendum, utrum hæc fluxio cōfertim fiat, an potius sensim. Cui quidem quæstioni satisfaciens Gal. 10 de imp. med. secundum loca ca. 2. dicit irruentem morem, id est, cum impetu fluentem arthritidem esse causam. quibus ex verbis colligo ipsum estimasse, fluxionem humorum confertim fieri non autem sensim, idq; non iniuria, nam quocumq; hoc pacto fluunt humores, partes subsistentes non extēduntur, sed laxantur; ad arthritidis autem generationem necessaria est partium articulis proximarum extensio. Hinc facile elicitur responsio ad argumentum, quo nititur propterea Fernelius in arthritide non fluere humorem per venas ad loca affecta. habet enim sic auctor is: in hoc affectu p venas fieret fluxio, sequeretur quoque cum Anasarca dolores coniungi articulos; quandoquidem in ea per venas confluunt humores ad articulos, & omnes partes corporis. quod argumentum in promptu est solutio. si eadem cum Anasarca quandoque iunguntur dolores articulorum, quandoque non, pro ut humor ad articulos per venas aliquando cōfertim, quando sensim confluit. quia verò sensim ut plurimum confluit, propterea Anasarca corripitur rarò articulorum doloribus corripuntur, modò lenta fluxio articulorum partes relaxet, non extendat.

De termino à quo influit humor in articulos. Cap. 19.

Humores interdum à toto corpore, interdum ab eiusdem partibus ad articulos confluunt. Aueriois enim 7. collig. 37. testatur se ex febre cuta in podagram esse delapsum. quod ideo contigisse verè potest existimari, quoniam in eo à toto in articulos humor decubuit. quem enim latius in acutis febribus sæpe in toto humores reducere? Præterea si Hippoc. 4. aphor. 44. & 45. dixisset Quibus febres longæ, dolores in articulis fiunt, quare non est putandum voluisse Hippocratem ad articulos ex toto corpore redundantes humores confluere, cum in diuturnis febribus non vnam partem, sed plures, interdum etiam vniuersum corpus supernuacanei humores occupant. Quod ad partes corporis attinet, à quibus defluunt humores, Hippoc. in libro de locis in homine, proponit caput, dicens, ab eo potissimum articulos fluxiones fieri, A ventriculo quoque intestinis manant fluxiones teste tum experientia, tum Paulo, qui lib. 3. cap. 43. ex dolore colici fieri coxendicium voluit, aliasq; species arthritidis. Incipit quandoq; fluxio à renibus: quo fit nostrates vulgari prouerbio dicere cōsueuerunt Dolore di rene, gotta viene. Non rarò materia vtero decurrit: vnde Hippocrates mulierem podagra conflictari negat, nisi menstrua defecerint. Suppressis etenim mensibus aliquando ad articulos pedum ab vtero fit fluxio; ex fluxione podagra. Ab alijs etiam partibus, ijsq; principibus, fit potest fluxio; quapropter Ga. 2. de natura huma

com

in fine sic scribit: In his, qui articulati
orbo, aut podagræ obnoxij sunt, si ab artubus
pulsati sint humores ad aliquam partem princi-
alem, in eo solum remanet spes salutis si iterum
ad artus possint reuelli. Constat itaque quamplu-
ma esse loca, à quibus ad articulos fluxio fieri
ueat. Itaque Fernelius, vir alioquin doctissimus,
eo non leuiter errat, quòd existimet à capite
blo, imò verò à capitis duntaxat partibus exter-
is, non autem internis, humores in articulos de-
umbere. quippe ex eo sequeretur semper arthri-
idi adesse capitis grauitatem, tumorem sub capi-
is cute, somnum longum & profundum, propria
uitæ symptomata, cuius vnus à capite fieri flu-
ionem ad articulos idem opinatus est. contrà ve-
ò experientia sæpe testata est arthriticos his sym-
ptomatis nunquam exagitari. Nec rationem red-
dere Fernelius vllò modo possit, cur ex coli aut
enim dolore dolor articulorum proueniat, nisi
ex intestinis & renibus erumpere materiam ad
caput, à capite subinde ad articulos decurrere fa-
teatur; quo quid naturæ laboriosius, rationi verò
alienius, cum ab iisdem partibus ad artus imme-
diatè fluxio promoueri possit? Illud verò ridicu-
lum, si Fernelius locum Hippocratis iam allatum
sic intelligat, mulieres mensibus suppressis in po-
dagram incidere, quoniam ex vtero primum ad
caput, ab hoc deinde ad articulos pedu delati hu-
mores podagram pariunt. nam credibilius recto
tramite ab vtero, deficientibus mensibus, ad pe-
dum articulos humores transmitti. Denique si

materia semper á capite deflueret, ad probè curandam arthritidem capiti semper essent adhibenda remedia diuertentia & euacuantia: quotidiana tamen doctissimorum virorum praxis abundè conuincit remedia capiti adhibita plerumque in arthritide nihil conferre. Perspicuum iam est fluxionem non ab vnica parte, sed á pluribus, adeoque toto etiam corpore ad articulorum loca dimanare posse.

De termino ad quem ipsius fluxionis, & Fernely sententiæ confutatio. Cap. 16.

Feruntur humores motu suo ad ligamēta, quæ substantia constant neruis quàm simillima, non tamen verò eiusmodi obtinuerunt, quòd ossium extremitates inter se copulent atque connectēt, quemadmodum colligitur ex Gal, lib. de motu muscul. ca. 2. & 12. de vsu partium cap. 2. Feruntur præterea humores ad cavitates articulorum auctore Auicenna, qui lib. 3. fen. 22. tract. 2. cap. 5. dicit, ad piscidem, id est articulorum cavitatem fieri fluxionem. Nonnunquam etiam suscipitur humor sub membranulis artuum; id quod non raro cadauera declararunt, in quibus materia gypseæ arthritidis causa effectrix sub membranis, atque in cavitatibus articulorum reperta est. Nunc verò quemadmodum tendines per consensum extenduntur, vti suprà demonstraui; ita quoque ligamenta, dum materia sub membranis colligitur, per consensum membranarum tensione affici credendum est. De locis, ad quæ in arthritide fluxio tēdat, hæc satis. Ferneliū iam aggrediamur.

Is re-

reperiri humorem in ligamentis, membranis
ossium extremitates ambientibus, deniq; ten-
onibus lubens fatetur; in cauitate verò seu spa-
cio inter ossium extremitates interiecto humorẽ
reperiri nulla ratione posse autumat. in quo non
modo à communi omnium consensu, verum etiã
ipsa ratione vehementissimè dissentit. Si enim
tendines replerentur in arthritide, fieret aut pa-
ralysis aut conuulsio: hæc quidem, repletis tendi-
um partibus externis; illa internis. Miror pro-
pterea tantum virum tam turpiter errasse, sui que
deò immemorem extitisse, existimauit enim (ut
atebit postea) nunquam per neruos aut spinalẽ
medullam fluere materiam, quoniam paralyfin
excitaret. quæ ratio si efficax est, nostras quoque
partes confirmabit, illius infirmabit sententiam.
Sic enim telum in hostem retorquemus: si hæreat
materia in tendinibus, orietur paralyfis, quòd tẽ-
lines ex substantia consent neruorũ & ligamen-
torum. Idem medicinæ scriptor putauit nunquã
materiam fluere ad cauitates articulorum, primũ
quoniam materia gypseã in eis reperiretur; id qđ
negat vñlo vnquam experientiæ testimonio con-
firmatum, sed semper in tophacea podagra mate-
riam sub membranis ossium extremitates cingẽ-
tibus repertam fuisse contendit. quæ ratio vtroq;
(quod aiunt) pede claudicat. neque enim antece-
dens concedendum est, neque consequentia non
neganda. Nam quamuis materia gypseã in nodo-
sa tophacea ve podagra, vel chiragra, aperta cute,
non conspiciatur in cauitate, sed sub membranis

articulorum; non tamen sequitur eandem, ante
 gypsea fieret, ad cauitatem non fluxisse. non appa-
 ret in cauitate gypsea, vel quia fluida ibi existen-
 motu articulorum fuerit discussa, vel repulsa a
 membranas, vbi propter earum densitate detenta
 in gypseam tandem est commutata. falsum pre-
 terea illud numquam esse repertam materiã gyp-
 seam in cauitatibus articulorum. Superest alter
 Fernelij argumentum, quo sibi videtur probari
 numquam ad cauitates articulorum humorem
 confluere. si confluere, inquit, sequeretur ex eo
 aut dolorem articulare non fieri, aut valde re-
 missum, quandoquidem ossium extrema, quorū
 ad cauitates, & spacia humor dicitur fluere, aut non
 sentiunt omnino, aut admodum obtusè. Hæc Fe-
 nelij ratio, si extrema ossium arthritidi essent ob-
 noxia, vtique cōcluderet; verum superius docui-
 mus ex Gal. 6. aphor. 49. & alibi locum in arthri-
 tide affectum non ossium extremitates, sed ipsi
 proximos tendones, neruos, atque membranas
 Quando enim materia confluit ad cauitates au-
 ligamenta, vel membranas subit, tum tendones
 nerui, atque membranæ distentæ dolore afficiun-
 tur, non quidem obtuso, sed vehementi & per-
 acuto; vtpote quæ suapte natura exquisito admo-
 dum sensu sunt prædita. Ex ijs quæ iam dicta sunt
 luce clarius euadit, quæ loca humori suscipiendo
 sint apta; præterea quædam humorem quidem
 suscipere, dolorem non item; quædam vtrumq;
 hæc membranæ sunt ossium extrema ambientes
 illa cauitates, ac ligamenta.

Cur nervi tendinesque non repleantur, & Erasmi opinionis confutatio. Cap. 17.

ERastus optimè de re medica meritis, arrepta ex ijs quę dicta sūt occasione, quærit in quarta ipsius disputatione contra Paracellsum, cur nam in podagra nervi, & tendines non repleantur, cui quidem quæstioni respondens idem auctor, non repleri vult, quia vt plurimum ad pedes confluit humor aqueus nullam habens extendendi facultatem, sed potius laxandi. Hæc clarissimi viri responsio Galeno & rationi, quàm maximè repugnat. Gal. enim 6. aphorif. 49. voluit nervos, & tendines ad extensionem ligamentorum extēdi, non autem laxari; si namq; laxarentur, ægri nullo efficerētur dolore; quoniam dum partes nervosæ non extenduntur, sed laxantur, vti contingit in anasarca, non succedit dolor. Verum si arthritidis est tristis sensatio tensiva, velut docuimus, quis negare audeat partes sensitivas extendi? Ad hæc si non replentur atq; extenduntur tendines nervique, quoniam materia eò vt plurimum confluens est aquea: igitur defluere ad pedes alio humore, quemadmodum aliquando defluit, subsequeretur nervorum & tendinum repletio, adeoque convulsio. Gal. tamen 6. aphorif. 49. inquit: Nervos & tendines non est rationabile repleri, sed solum dolere, quia simul cum de articulationibus extenduntur, argumento quoniam visus est nunquam podagricus pati convulsionem, quæ solet in chordarum inflammationibus aduenire. hæc Galenus. Ad has fortasse respiciens obiectiones

Erastus inquit: si ea non est causa cur tendones, & nerui non repleantur, quæ nam ea sit, me nescire ingenuè fateor. quæ cum ita sint, Erasti dubitationi sic verius satisfaciendum putamus. In omni arthritide, non solum podagra, articulorum loca replentur atque extenduntur; per consensum verò tendines, & nerui non modo distenduntur, verum etiam distentione comprimuntur; quo fit ut repleti nequeant. Hæc responsio similitudine adhibita fiet illustrior; quemadmodum sponsa si manu extendatur, & comprimatur, aqua non potest repleti, eodem quoque modo dum nerui, & tendines ad extensionem ligamentorum extenduntur & comprimuntur, non possunt humore repleti, nec conuulsionem pati. Hæc de loco ad quem humor confluit.

De spaciis per quæ confluit humor, & sententia Fernely confutatio. Cap. 18.

Spacia, per quæ ad articulos fluxiones feruntur multiplicia sunt, sensibilia nempe, & insensibilia; sensibilia sunt spinalis medulla, nerui, venæ, arteriæ, & quæ inter cutem & carnem interiacet intercapedo. Insensibilia spacia reperiuntur unus dolor colicus, ubi in coxendicum migrat, indicio esse potest; si quidem nemini obscurum est, nullum adesse euidentem meatum, per quem à colo intestino ad artus coxæ vapor deferatur. Hoc loco nobis se offert confutandus Fernelius, qui nullum aliud fluxionis spaciū agnouit, præter illud, quod inter carnem & cutem interijcitur. in quo nemo sane mentis negauerit toto (quod aiunt) cælo hominem

inem errasse. Non ignoramus cum quibusdam
argumentis ad suam opinionem defendendam:
utrum ea inualida planè sunt, uti mox ostendem⁹.
Primo argumento nititur probare non fieri flu-
xionem per spinalem medullam, aut nervos, hoc
modo: si fieret fluxio per spinalem medullam &
nervos, oriretur paralytis; quod tamen admitti
minimè debet, quia in paralyti humor non fluit
per spinalem medullam & nervos, sed inibi deti-
netur, eaque replet: fluit autem dumtaxat in ar-
thritide, nec tum quidem secundum omnes par-
tes, sed solum secundum exteriores. Secundo ar-
gumento contendit humores per venas nō flue-
re ad hunc modum; si fluerent per venas, phleg-
mone fieret in arthritide: quod ipsi absurdum vi-
detur. verum nos id rationi maximè putamus cō-
traneum, idcūe iuxta sententiam Hippocratis
in octo aphor. quadragesimo nono arthritidem in
inflammationem hisce verbis referentis: Quibus-
cumque morbi podagrici fiunt, ij sedata in quadra-
ginta diebus inflammatione finiunt. quinimo Fer-
ri sui oblitus videtur, cum statuerit ex doloris
articularis vehementia attrahi sanguinem, tumo-
remq; fieri rubentem, qui nihil aliud est, quàm
inflammatio. Tertium eius argumentum est eiuf-
modi: si flueret humor per venas, nunquam syn-
cერი, sed semper permisti humoris fieret fluxio;
quandoquidem in venis nunquam syncerus, sed
semper mistus reperitur humor. cuius argumēti
consequentiam ut falsam negamus: ad eius verò
respondemus probationem, quòd & si humores

permisti in venis reperiantur, solent tamen synceri ab expultrici facultate propelli, veluti contingit in morbo regio, in quo bilis, licet permista in venis, ad cutem tamen syncera propellitur, similiter in cholera bilis syncera è iecore aut proprio folliculo per venas in ventriculum, & intestina egeritur, tandem que per os, aut aluum eieciuntur. Quod autem dicit Fernelius, si flueret humor per venas, cum anasarcha implicaretur arthritis, & his, quæ supra diximus, facile est respondere.

Que sint cause fluxionis effectrices, cum quomodo dolor, & calor attrahere dicantur. Cap. 19.

Cum fluxio humoris ad articulos sit motus localis, ad quem, præterea, quæ iam attigimus, requiritur motor; ideo in præsentia declarandum est, à quo motore, seu causa effectrice fluxio manet. Dicimus igitur, ut huic quæstioni satisfaciamus, excitari fluxionem ab agente, quod attrahit, vel expellit, attrahens ex Galeni sententia libr. de tumoribus præter naturam capite secundo nullum aliud est, quam dolor, aut calor. omnis attractio ex hoc, aut illo provenit. Argenterius lib. suo de causis morborum inscripto. capite 6. hanc non solum Galeni, sed aliorum ferè omnium sententiã euertere conatur; quia tamen me inò est instituti singulas Argenterij opiniones perstringere, rationesq; refellere, sed tantum docere modum, quo à dolore, & calore fiat attractio, propterea illius argumentis prætermisissis, quod institui, id prosequar. hoc autem ritè percepto illius argumenta omnia corrunt. Quod igitur ad calorem attinet, habet

bet is quidem vim rarefaciendi poros, dilatandi
eatus, humoresq; tum attenuandi, tum in sui
substantiam conuertendi, necnon eosdem discu-
endi, quæ dum fiunt, insurgit facultas attractrix
attrahendum, ne vacuum subsequatur, & at-
tractionem efficit; sed quia à calore præter natu-
ram maior fit humoris consumptio, rarefactio, &
dilatatio, quàm naturæ conueniat; idcirco fit ma-
ior quoque attractio quàm par sit, attractæque
materiæ fluxio. Hinc colligitur calorem non esse
causam immediatam attractionis, quòd omnis o-
peratio præter naturam Galeno teste 3. de sympt.
causis ca. primo immediatè fiat à frustratione fa-
cultatis; quare & attractio deprauata producitur
frustratione facultatis attrahentis tanquàm à cau-
sa immediata. hæc enim frustratur, quia non solū
attrahit quod sibi est familiare, sed etiam, ne sub-
sequatur vacuum, quod est alienum non tam co-
mune, quàm qualitate, interdum etiam substantia.
Insurgit verò ad attrahendum, vt docet Galenus
primo de symp. causis ca. 7. propter consumptio-
nem humorum, quæ tanto vehementior existit,
quanto calor magis est noxius, maioremq; vim
habebet vasa dilatandi, porosq; rarefaciendi. Calor
quoque non proxima, sed remota attractionis cau-
sa si articulos afficiat, ad eosdem, velut diximus
redundantes humores attrahit, vnde Galenus 4.
phorif. 31. scribit ex vehemēti exercitio calefieri
articulos, ad eosq; humores redundantes attrahi,
facileque ibidem suscipi, quòd latiora ipsorum
membrana ad superfluitates suscipiēdas sint aptissima.

quibus verbis non tantum colligitur calorem esse
 se causam attractionis, sed etiam receptionis, cum
 dicat Galenus propter latitudinem spaciorem
 promptos esse articulos ad suscipiendum, latitu-
 do namque fit à calore. Haecenus de calore; nunc
 de dolore pauca dicamus. Galenus lib. de curandis
 ratione per sanguinis missionem cap. 8. dolorem
 attractionis causam statuit, quamvis 13. meth. c. 3.
 & 5. aphor. 53. idem Galenus dolorem expulsionis
 causam esse affirmet. ad quæ respiciens Argente-
 rius, dixit manifestam in dictis Galeni apparere
 contradictionem. Verum facile Galenū à calum-
 nia vindicabimus, si, quod res est, dixerimus do-
 lorem nihilo magis attractionis, quam expulsio-
 nis causam esse. Quo autem pacto à dolore fiat ex-
 pulsio, colligitur ex eodem Gal. 13. meth. capite
 ubi ait facultatem expultricem ad doloris expul-
 sionem excitari; eamque, ubi primis conatibus
 nihil profecit, maioribus nervis intentis vehe-
 mentius dolorem aggredi, quousque quicquid
 est molesti aliò propulerit, vnde & humoris au-
 vaporis non nihil à se tandem auertit. Nihil igitur
 mirum, si dixerit Aetius ex dolore lumborum fieri
 coxendicum. Similiter si voluerit Paulus lib. 3. ca-
 43. dolorem lumborum, aliasque doloris articu-
 laris differentias ex dolore colico prodire. Siqui-
 dem lumborum, & intestini coli facultas expul-
 trix à causa dolorem excitante adeò irritatur, ut
 materiam illam ad alias partes non possit non ex-
 pellere; quo casu coxarum, aliarumque partium ar-
 ticuli, si fuerint imbecilli, quicquid transmittitur
 noxi

ij, id omne suscipiunt; unde ex dolore colico, lumborum ischias, aliæque arthritidis species oriuntur. Verum non minus attractionis, quam pulsionis dolor causa est, nam dum ab eo excutitur expultrix, fit maior expulsio quam fieri debet; quocirca optimè Galenus sanguinis & spiritus nonnihil ex parte dolente exprimi atque excludi scribit; tum autem daretur vacuum, nisi ad trahendum facultas attractrix se conuerteret; verò, quia plus ex finitimis partibus ad se trahendum conueniat, partem dolentem in tumorem attollit. Iam demonstratum est quomodo ex dolore, & calore fiat attractio. vterque enim attrahit, parte, in qua reperitur, inanita; præstat id humorem consumens, dolor verò expultricem nimium proritans, atque extimulans. Constat pariter quomodo ex dolore fiat expulsio, cum omne, quod dolorem partibus sensitivis, vel molestiam dolori proportionem respondentem præfert, siue qualitate, siue copia, siue substantia sic molestum, expultricem irritans expulsionis fit causa.

Cur in corpore redundet materia. Cap. 10

Quod non est, nec expelli potest, nec attrahi. humor igitur redundans, cuius ad articulos si expulso, tum attractio, in corpore existat necesse; cur autem inibi existat, nunc paucis explicabimus. Reperitur in corpore humor redundans, quoniam aut redundans generatur humor, si fuerit melancholicus, aut biliosus, ex caliditate, & siccitate iecoris; Si sanguineus, ex eiusdem

caliditate cum humiditate copulata; si pituitosus, ex intemperie frigida & humida, potissimum capitis, & ventriculi. Sensim genitus humor non euacuatur, sed plus iusto detentus augetur, vel quia pituita in capite genita, per nares, & palatum non euacuatur; vel quia dum generatur, in ventriculo, per aluum non expurgatur; quo fit ut non paucos diuturni inuadant morbi, à quibus nunquam in omni vita conualescant; cuius generis mala sunt podagra, articularis morbus, & calculus, quem admodum docuit Galenus 6. de sanit. tuenda 7. in fine. nam quemadmodum ex convenienti euacuatione homines à fluxionibus ad articulos præseruantur, ita etiam ex nimia retentione in easdem incidere consueuerunt, auctoribus Hippocrate, & Galeno 4. aphor. 74. Minimè itaque mirandum quod apud eosdem scriptum reperitur 4. aphor. & 29. & lib. de venæ sectione aduersus Erasistratū, mulierem podagra non laborare, nisi menstrua præternaturam detineatur: quinimo si optimè mulier expurgetur, neque podagricis, neque aliorum articulorum doloribus, neque lateris inflammationibus, neque epilepsiæ est obnoxia, neque morbo ferè vlllo infestatur; contra retentis mensibus nullum non malum incurrit. Constat ergo redundantes in corpore reperiiri humores, tum quia superflui generantur, tum quia sensim geniti propter eorum retentionem accumulantur, atque augentur. nonnunquam vtraque causa concurrit, ut videlicet præter modum geniti, præter modum quoque retineantur, ac congerantur. De causis arthritidis

antece

precedentibus, necnon coniuncta, hæc, ni faller, satis.

*Quis aer, quæ item ætas, & regio arthritidis producenda
conueniant. Cap. 21.*

Causæ arthritidis pcatarticae sunt variæ: aer, regio, ætas, cib^{us}, pot^{us}, & similia. Aer enim frigidus pituitæ redundantiam parit, eoq; maiorem, si fuerit ipse frigidior, corporaque aeri exposita imbeciliora. nam robusta in aere non admodum frigido collocata calidiora euadunt, veluti colligitur ex Hippocrate 1. aphor. 15. dicente; ventres ætate, & vere natura calidissimi sunt. Quamuis autem redundans pituita ex aere frigido, utpote ætate genita tunc non moueatur, sed in corpore centro maneat immobilis, vere tamen à centro ad circumferentiam, autumno contra à circumferentia ad centrum vnà cū alijs humoribus moveri solet. quocirca autumno & vere statuit Hippoc. 3. aphor. 22. & 6. eiusdem §. fieri arthritidem; moniam duplici motu facile redundans humor articulos pertingit, in ijsque dolores excitat. Quam modò vim habere diximus aerē ad pituitā immodicè accumulandam, adeoq; arthritidem producendam eandem planè vim retinet regio ætati proportionē respondens. Idem esto de ætate iudicium, nempe senili. Vnde merito dixit Hippocrates 2. aphor. 29. & 3. aphor. ult. senes omnium maxime doloribus articulorum esse obnoxios. Quod si quispiam nobis obijciat Hippocratis librum de affectionibus, in quo illud habetur, iuvenes frequentius arthritide corripi, quam cuius-

uis alterius ætatis homines: respondemus arthritidem duobus modis sumi posse; vel communissimè pro quacunque arthritide, vel propriè pro ea, quæ omnes articulos occupat, nomenque generis suo quodammodo iure sibi vèdicauit, quæ per excellentiam arthritidis, quòd omnium articulorum sit affectus. Arthritidis primi generis ut plurimùm à pituita producit, quippe omnis arthritidis, si Galeno credimus 10. de compositione secundum loca cap. 2. frequenter à pituita producit, quæ cum in senibus maximè redundet, id ò optimè dixit Hippocrates senes arthritidi, hoc est cuiusunque illius speciei maximè omnium obnoxio esse. Secundi generis arthritidis ortum trahit ab humore tenui, & bilioso; qui cum redundet in iuuenibus, non mirum, si ex Hippocratis sententia ipsa idem dicatur frequentissima. Hinc paret Hippocratem, qui primo intuitu sibi videatur contradicere, sibi quam maximè constare.

Quis cibus, & potus, quæque res alia non naturales ad arthritidis generationem conferant. Cap. 21.

INter alias arthritidis causas procatarcticas cibibus, & potus recensentur, qua de causa Galenus apertè docet 2. de aliment. facult. omnia olera, siue sint agrestia, siue domestica, esse valde excrementitia, & proinde frequenter eorundem usum non tantum arthritidem, sed alia multa mala in corpora inuehere. De feminibus autem loquens idem animaduertit Gal. c. 5. primi libri, cibum eumdem f. linatriticea cum lacte decocta dolores pariet articulares ex pituita, quæ tandem in tophos coarctatur.

arti solet. Similiter Hipp. 4. in 6. de morbis vul-
ribus 13. & Gal. 3. aphor. 16. ubi meminerunt de
minibus, quæ tamen legumina dicuntur, do-
erunt ab ijs ferè omnibus crura reddi imbecil-
bra, arthritidemq; ingenerari. In summa, fructus
te olerum, siue arborum, siue integra animalia,
te animalium partes, imò reliqui omnes cibi
imodice ingesti arthritidis sunt causæ. quare
udentissime dictum est à Gal. 6. de tuenda vale-
dine c. 7. & 6. aph. 28. necnon ab Aetio, & alijs,
hil repetiri ad prouehendam arthritidem apti-
borum multitudine; vitæ autem temperantiam
præseruandum hominem ab arthritide adiu-
enti plurimum adferre. Potus multi, ac præ-
tis vini, præsertim ante cibum, vt colligitur ex
aleno locis citatis, arthritidis fons est, & origo.
em de aq; potione per quam frigida pronūcia-
t Aetius, ac præter Aetiū etiam Paulum lib. 3. c. 28.
quod eo maiorem fidem meretur, quoniā ex-
erientia sæpe docuit eos, qui cum vino glaciem
ommiscent, articulares morbos pati consueuis-
E. Exercitium quoque immodicum inter causas
ternas arthritidis connumeratur; præ alijs verò
ercitij generibus crebra, & continua equita-
ones. Hoc Scythæ experiuntur, qui quoddam in e-
irationem toti incumbant, multis, ac diutur-
s doloribus omnium articulorum, sed præci-
cè coxendicum, & pedum excruciantur, quem-
modum colligitur ex Hipp. lib. de aere, aquis,
locis. Immoderata venus inter alias species im-
modici exercitii arthritidis origo esse solet, quod

ab ea relaxentur articuli, eaque ratione ad suscipiendas superfluitates aptissimi reddantur. hinc factum est, ut testatur Hipp. Eunuchos sua ætate arthritide non laborasse: postea verò propter vitium intemperantem, licet venerem non exerceant, articularibus morbis torqueri ceperunt, quod ætas nostra quotidie confirmat, non raro item Galeni tempora confirmarunt eodem modo teste 6. aph. 28. ubi & inter alias procatarcticas arthritidis causas otium recenset, cuius causa cum articuli fiant imbecilles, humoresque redundet, non solum podagra, sed etiam alij morbi articulare subsequuntur. De causis externis insignioribus iam diximus; multæ alię possent proponi, sed quæ partim cognitu faciles sunt, partim ab Auicenna, Aetio, Paulo, alijsque in medium allatæ; idcirco eas silentio præterimus.

De differentijs arthritidæ.

Cap. 23.

Iam de essentia, omnibusque causis arthritidis loquuti sumus; de differentijs eiusdem nunc ordinis ratio postulat, ut loquamur. hauriuntur autem differentiæ ex partibus definitionis, nam perpendatur arthritidis, ut vires lædit, id quidè intelligi potest, vel de parte affecta, vel de toto corpore. Si lædat vires vnius partis affectæ, tum motum tantum difficiliorem reddit, & hæc leuatur arthritidis, vel ita lædit, ut articularum elaxatio, partiumque proximarum siccitas inde veniat, quæ arthritidis grauior appellatur, quæ verò totius corporis vires labefactat, inducens inmodicas vigilias, vel lipothymiam, vehementi

fin

na nuncupatur. Diximus præterea in definitio-
ne arthritidem ex redundante materia ortum du-
cere; hæc autem materia vel est vapor, vel humor,
unde oritur arthritis, vaporosa, & humorosa. hu-
morosa porro est varia pro diuersitate humoris à
quo producitur, vel .n. syncera est arthritis, vel mi-
sta, illa ex syncero, hæc ex misto producitur humo-
ris, illa, vel sanguinea, vel pituitosa, vel biliosa, vel
melancholica existit, prout ab humore sanguineo,
pituitoso, bilioso, aut melancholico ducit origi-
nem. Mistæ arthritis pariter varia existit, variasq;
habet appellationes pro varietate humorum, à
quibus simul mistis ortū trahit. Insuper in arthri-
tidis definitione diximus redūdantem materiam
in locis articulorum reperiri; ex qua parte defini-
tionis colliguntur variæ eiusdem differentia, put
antur sunt articuli, loca que articulis proxima in-
ter se diuersa. Itaque si articuli pedum afficiantur,
podagra, si genuum, gonagra; si coxarum, ischias;
si manuum, chiragra arthritis vocitatur. Quando
erò plurimi, vel omnes articuli afficiuntur, ex
Galeni sententia 3. aph. 16. & ex Hipp. libto de af-
fectionibus, affectus hic nomen generis pro suo
ibi assumit. Quod si loca articulis proxima, qua-
tenus redundantem materiam suscipiunt, consi-
derentur, variæ oriuntur species arthritidis, put
diximus materiam reperiri, vel in cauitate arti-
culorum, vel in ligamentis, vel sub membranis
ossium extremitates ambientibus, sub quibus dū
reperitur materia redundans, fiunt affectus osto-
poci appellati, idest qui ossium dolentium ima-

C

ginem inducunt, vt docet Galenus 2. de locis affectis 7. Possunt etiam capi differentia à loco, unde fluxio manat. Si dicamus arthritidem fieri per consensum, vel à toto corpore, vel à capite, vel à ventriculo, vel denique ab alijs partibus, prout humor, vel à toto, vel à capite, vel à ventriculo, vel denique ab alijs fluit partibus. Hæc de omnibus differentijs arthritidis dicta sufficiant.

De Signis demonstratiuis arthritidis, eiusque differentiarum. Cap. 24.

Iam ad signa arthritidis, eiusque differentiarum proponendam accingo. Non difficulter hic affectus in genere cognoscitur, quia omnes arthritici de dolore articulorum tensu, moruque difficili conqueruntur. Nam etsi dolor non tensus in articulos cadat, superius tamen ex Galeni sententia 3. aphor. 16. ostendimus alium quam tensum arthritidem dici non posse. Pari facilitate dignoscuntur arthritidis differentia à virium læsione desumptæ. nam si arthritidis erit levis, motus tantum difficilis articulorum conspicietur; si grauior, eluxatio articulorum, partiumque affectarum tabes apparebit; si vehementissima, præter ea quæ iam dicta sunt vigilia, lipothymia, syncope erunt annexa. Signa arthritidis differentiarum, quæ ex materiae redundantia hauriuntur, colligi possunt ex Auicenna lib. 3. fen. 22. tract. 2. cap. 6. ex Gal. 10. de comp. med. secundum loca ca. 2. & ex Aetio 3. tetrabilium sermone 4. à 13. capite vsque ad 20. Capiuntur autem vel ab ijs, quæ essentialiter arthritidi inherent, vel ab ijs, quæ necessariò arthritidis

is naturam consequitur, vel ab eius causis. Essentialiter inhæret dolor, qui si fuerit tantum tenuius, significat arthritidem à flatu productam, quemadmodum docuit Auicennas; si fuerit tenuius, & grauius, arthritidem ab humoribus genitam demonstrat; hic autem dolor cum sensu caliditatis, aut frigiditatis est iunctus, atque vel humoribus calidis, vel ex frigidis genitam esse arthritidem significat. Dolor autem non solum tenuius, sed grauius, & cum sensu caliditatis iunctus, vel habet sensum vlceris annexum, vel non; hic arthritidem ex sanguine productam significat, ille verò ex bile; vterque enim dolor ad differentiam arthritidis ex flatu, tum tenuius est, tum grauius; ad differentiam verò arthritidis ex humoribus frigidis, cum sensu caliditatis iunctus. Differunt porro inter se, quòd dolor ex bile sensum vlceris habet annexum, non autem qui ex sanguine prodit; nam etsi vterque humor exten- dere, sensumq; non tantum grauitatis, sed etiam caliditatis in partem affectam inducere possit, bilis tamen sensum vlceris insuper producit, san- guinis non item. Verùm dolor ex humoribus frigidi- bus genitam arthritidem significans, vel est solum tenuius, grauius, & cum sensu frigiditatis iun- ctus, vel etià habet annexum sensum asperitatis; hic ex melancholia, ille ex pituita genitam arthri- dem denotat; vterque enim humor sensum ten- sionis, grauitatis, & frigiditatis parti dolenti im- pertire potest; melancholia porro sensum asperi- tatis quoque communicat, pituita verò minimè.

*De signis arthritidis ex necessario consequentibus
desumptis. Cap. 25.*

Signa arthritidis demonstratiua non solum capiuntur ab ijs, quæ ipsi essentialiter inhaerent de quibus diximus; sed etiam ab ijs, quæ eius naturam necessario consequuntur, de quibus nunc sermo est habendus. Signa arthritidis naturam necessario consequentia sunt, arthritidis, eiusque causæ coniunctæ symptomata, videlicet qualitates mutatae, operationes, quæque præter naturam vel excernuntur à corpore, vel in eo retinentur. Qualitates, vel vnius sensus sunt propriae, vel plures communes. Vnius sensus propriae in quibus duplici sunt differentia, loquor enim de ijs tam modo, è quibus peti possunt arthritidis signa, cuiusmodi sunt qualitates visibiles, tactiles, auditivae, perceptivae, atque gustabiles. Quod ad visibiles attinet qualitates, color partis affectæ rubens denotat arthritidem sanguineam, flauus biliosam, albus pituitosam, niger melancholicam; color denique mixtus arthritidem ex variorum humorum commixtione ortam. Qualitates tactiles reduci possunt ad ea, quæ dolori essentialiter inhaerent de quibus iam dictum est. Quæ verò auditus sunt propriae, ijs arthritidis species sic internoscas, si sonitum in parte affecta percipias, vel secus. Sonitus namque in hypochondrijs, aliaue parte laborantibus editus, indicio est arthritidem ex flatu provenire contra nullo sonitu percepto, rationi consonum est arthritidem ab humoribus pendere. Qualitates gustabiles diversas arthritidis produunt differentia

ntias pro diuersitate saporum, qui lingue egro-
n sese offerunt. Quare sapor exactè dulcis ar-
thritidem ex sanguine productam declarat; leui-
admodum dulcis, aut nullus, arthritidem ex
pituita insipida; salsus ex salsa; acidus ex acida; acerbus
enique; ex melancholia arthritidem denunciat, quod
uarij simul sapores gustu percipiuntur, arthritidis
humoribus diuersi generis erit. Qualitates o-
rribiles silentio inuoluimus, quoniam ex ijs
nulla fieri potest arthritidis specierum internotio.
Qualitas communis sensuum est forma, seu figu-
ra, qua species arthritidis discriminantur, quate-
nus locus alius formabilis est, alius nequaquam.
Formabilem vocamus, qui manu factam compres-
sionem permanentem retinet; non formabilem,
qui contra. Locus affectus formabilis demonstrat
arthritidem ex pituita viscida, œdematosam nun-
cupatam auctore Æneo 3. tetrabilium sermone
capi. 16. Locus affectus, qui comprimente ma-
nu foueam permanentem nequit suscipere, vel
manu potest comprimi, quod est argumentum
arthritidis biliosæ, & serosæ; vel nequit compri-
mi, & sic indicatur sanguinea, melancholica, &
trophacea. Cur autem affectus locus arthritide so-
lum œdematosa sit formabilis, curque arthritide
biliosa & serosa laborans sit pressibilis, non autem
corruptus melancholica, trophacea, aut sanguinea,
non est huius loci disputatio, sed pertinet ad tra-
ctatum de tumoribus, ubi quæredum, cur tumor
solum œdematosus sit formabilis, alij verò non-
nulli tantum pressibiles, nonnulli etiã eiusmodi,

ut nec comprimere quidem possint. Hæc de symptomatibus in qualitate mutata, à quibus capiuntur signa arthritidis; nunc omissis operationibus læsis, utpote quæ aptius ad essentialiter arthritidis in hærentia superius tradita, quam ad necessariò consequentia referantur, transeamus modò ad excreta, atque retenta præter naturam, quæ & ipsa varias arthritidis species innuunt. Urina flava arthritidem biliosam, alba & tenuis serosam, alba & crassa pituitosam insinuat. Quod dicimus de urinarum differentiis, idem etiam de omnibus reliquorum excrementorum differentiis dicendum est. Ad eundem modum retenta præter naturam diuersitatem arthritidis indicant, nam suppressa pituita, quæ per nares expurgari consuevit, verisimile est arthritidè esse pituitosam; ex mensibus præter naturam suppressis, aut sanguine, qui per nares, vel hæmorrhoides expurgari solitus est, absque dubio arthritidis sanguinea declaratur. Hæc de signis à necessariò consequentibus satis.

De signis arthritidis à causis desumptis. Cap. 16.

Cum omne illud, quod arthritidem significat, eius signum dici possit, nò est mirum si ipsius causæ inter signa quoque connumerentur. Harum autem aliarum externarum, aliarum internarum, internarum porro quædam præter naturam, quædam secundum naturam. Ex illarum numero, quæ sunt præter naturam, nonnulli morbi existant, qui quatenus efficiunt, vel fouent arthritidem, eius quoque causæ dicuntur, quatenus verò eandem demonstrant, signi nomine donantur. Itaque si arthritidis febrem aliquam

aliquam acutam consequatur, qualis fuit ea, quæ
Auerroes 3. collig. 31. correptū se fatetur, ex tenui-
bus humoribus, præcipuè bile, producitur. quod
si dolores articulares longas consequantur febres,
quod non raro accidit teste Hippo. 4. aphor. 44.
arthritis ex humoribus crassis, & viscidis genita
significatur. Cæterum non solum causæ præter
naturam, sed etiam naturales arthritidis sunt in-
dicia, inter quas temperamentum, sexus, & ætas
recenseri possunt. etenim pro diuersitate tempe-
ramenti, sexus, & ætatis diuersi solent redundare
humores, ex quibus arthritis oritur, exempli gra-
tia, iuuenis arthriticus indicat arthritidem fieri
ex prædominio bilis, & de hac loquutus est Hippo.
dum dixit in libro de affectionibus iuuenes esse
valde obnoxios arthritidi. Eadem arthritis in æ-
tate senili ex pituita producitur, & de hac loquu-
tus est Hippo. 5. aphor. ult. ubi dixit senes non so-
lū spirandi difficultatibus, sed doloribus articularū,
alijsque morbis ex pituita obnoxios esse. quod nō
solum animaduertit Galenus in commento illi-
us aphorismi, sed etiam 8. libro de decretis Hippo.
& Platonis cap. 6. Præter causas intrinsecas inter
signa arthritidis connumerantur etiam causæ ex-
ternæ, siue sint præteritæ, siue præsentēs. si præte-
rierint causæ refrigerantes, significatur arthritis
ex humore frigido genita, si calefacientes ex cali-
do. Si quis enim post longam moram sub aere fri-
gido, in regionibus pariter frigidis, locis subter-
raneis, utpote carceribus degens, post frequentes
bathones, post usum ciborum frigidorum, post

diuturnum otium inciderit in arthritidē, cui dubium esse potest, quin ex præcedentibus facta si arthritidis pituitosa, atque ab eisdem veluti signis quibusdam apertissimè declaratur? Et contrarij causis non solum arthritidem biliosam produci, sed etiam clarissimè indicari quis iam ambigat? Quod attinet ad causas præsentēs, hæc quidem censentur ea omnia, quæ lædentia, & iuuantia appellantur, nam si quis arthriticus venæ sectione persanetur, aut saltem subleuetur, manifestum est sanguine fuisse genitā arthritidem; qualis ea fuit, quam proficitur Galenus sola sanguinis missione se curasse. Similiter si quis arthritide correptus usu calidorum recreetur, arthritidis pituitosa, aut melancholica significatur, contra verò biliosa, sanguineave, si ex eorum usu detrimentum patiatur. Idem de reliquis omnibus iuuantibus, ac lædentibus esto iudicium.

Signa locorum in arthritide laborantium. Cap. 27.

EXposita sunt signa arthritidis cuiuscunq; ex materię redundantia, iā exponenda quæ a loco capiuntur affecto. Facillimus autem est cognitio locus affectus, cum ne ægri quidem ipsi ignorent sibi dolere modò pedes, modò crura, modò manus, ac proinde laborare se, vel podagra, vel gonagra, vel chiragra dolorem. n. ubi ubi est, presentiscāt ægri est necesse, ex cuius perceptione partis affectę cognitio statim emergit. Verū non est æq; facile causæ arthritidem efficientis locū affectum patefacere, hoc est declarare vtrum materia redundet in cavitatibus articulorum, an sub eorum mem-

membranis, vel potius in ligamētis. Nos quidem
dicimus, si tumor fuerit externus, & valde euidēs,
redundantem materiam in ligamenti reperiri;
si fuerit internus tumor parumque euidens, aut
lanè imperceptibilis, materiam redundantem
in cavitatibus consistere, vel membranis arti-
culorū subesse. Præterea si dolor erit profundus,
iudicio est cavitatem, vel membranam in se con-
tinere materiam; si verò fuerit in superficie, liga-
menta repleta esse. Non solum autem agri expli-
re consueverunt, vtrum eorum dolor sit pro-
fundus, an in superficie, sed etiam manus imposi-
tione, dum cōprimatur locus affectus, id cognos-
ci potest. si enim ex cōpressionē augeatur dolor,
significat in superficie cōtineri; esse verò profun-
dum, si ex compressionē non increseat. quando
dolor ossium dolentium imaginē inducit, quem-
admodum Galenus docet 2. de locis affectis 7. ma-
teria sub membranis extremitates ossium ambi-
atibus collecta est. Motus valdè difficilis, & elu-
atio denotant materiam contineri in cavitare, in-
na quia redundante materia gibba pars ossis cō-
tineri nequit, subsequitur luxatio, quæ nullo mo-
do remoueri potest, nisi materia collecta in cavi-
tate euacuetur. Ex luxatione etiam colligitur affe-
ctus esse ligamēta, vtpotè madefacta, & laxiora red-
dita; quæ luxatio in eo à priore luxatione differt,
quoniam quemadmodum madefactis, & laxiori-
bus redditis ligamenti facile articulus cavitare
recidit, ita etiam sine difficultate eò recidit, veluti
notat optimè Galenus 6. aphor. vltimo, & Auicē.

nas lib. 3. fen. 22. tract. 2. c. 5. Itaque luxatio, quæ facile remouetur, significat affecta esse ligamenta, quæ difficulter corrigitur, repletam cauitatem demonstrat; quæ verò luxatio insanabilis est, repletam materia gypsea cauitatem ostendit. Illud hoc loco obseruatione dignum, in ischiate pariter affligi crus, & pedem, quemadmodum colligitur ex Aetio c. 1. quarti sermonis tertij tetrabiblicum quamuis materia in locis articulorum cruris, & pedis non fuerit collecta. Dolent enim crus, & pes propter cōsensum, & communionem, quarum habent cum coxa affecta, ex cuius ligamenti pendunt tēdones, qui sui longitudine vsque ad cruriferuntur, vnde dolorem coxendicum cruri quoque communicant; haud aliter cum tendines magni ab articulis, & ligamenti cruris oriantur, & vsque ad pedem pertingunt, pedi quoque dolorem impertiunt. Hæc de signis loci in arthritide laborantis

Signa locorum, à quibus ad articulos humores fluere consueverunt. Cap. 28.

NON solum autem cognitu sunt necessaria loca redundantem materiam suscipientia, sed etiam ea, à quibus fluxio fieri solet. Quare si fiat toto, ex præcedētibz febribz, ex cachexia, alijsque totius corporis signis demonstratur; si fiat capite, non tantum ex eius grauitate, somno longo, & profundo, sed ex eiusdem tumoribus, & alijs affectionibus indicari potest; quemadmodum quoque si fiat fluxio à ventriculo, non solum ex suppresso vomitu, sed etiam ex quāplurimis alijs signis elucescit; si fluat materia ab utero, præcesserit defectus

fectus mēsum; si ab intestino colo, colicus do-
r; si à lumbis, & renibus, harū partiū dolor. om-
nium partium affectarū signa in præsentia com-
memorare otiosum foret; ideoq; de signis locorum,
quibus sit ad articulos fluxio, hæc pauca sufficiāt.

*De signis prognosticis arthritidis in genere, omnium-
que eius differentiarum sit loquendum; cur item omnis
arthritis sit plurimum difficulter curetur. Cap. 29.*

VT indicantium omnium ad arthritidem atti-
nentium exacta habeatur cognitio, posteaq;
de essentia arthritidis, de omnibus eius causis, at-
que differentiis, necnon de signis eiusdē demon-
stratiuis, omniumq; illius differentiarū diximus,
de prognosticis nunc est dicendum, idq; ea potis-
imum de causa, quòd magni referat intelligere
uænā arthritidis curari possit, quæ non; quæ nā-
ue incurabilis est, soli prognostico relinquen-
da; quæ verò curationē admittit, remedijs per in-
dicationem inuentis curanda est. In recensendis
autem signis prognosticis ad arthritidem spectā-
tibus, fiet progressus ab vniuersaliorib; ad minus
vniuersalia; quē ordinem in superioribus quoque
seruauimus. Itaque si sermo fiat de omni arthriti-
de, dicimus arthritidem vt plurimum esse curatu-
m difficilem, quoniam in omni arthritide afficiun-
tur partes frigidae, siccae, atq; duræ, quarum ea est
natura, vt materiā redundantem diutissimè asser-
uant. Itaq; dictum est à Galeno 6. aphor. 49. qua-
nim ratione vix aliquid in se humoris externi su-
cipiunt, cum duræ sint, & densæ huiusmodi
partes, hac ipsa ratione cum difficultate dimittūt.

D

*Signa prognostica differentiarum arthritidis, quæ à causis
formali proficiuntur.* Cap. 30.

QUOD magis arthritidis lædit facultatem corporis gubernantem, eò difficilius curatur. Si enim arthritidis vigilias inducat vehementissimas, syncopen, aut lipothymiam, adeò ut cogantur medici loco dolenti applicare stupefacientia, periculum est ne repellantur humores ad aliquam partem principem, & ægro interitum afferant; cum ea scilicet tunc supersit spes salutis, si iterum possint ad artum reuelli, quemadmodum optimè Galenus secundo de natura humana commento quinto. QUOD si arthritidis lædat tantum vires partis affectæ, difficulter & ipsa curatur, nam si partis dolentis tabernaculum producat, efficit proculdubio morbum ægrè curabilem, nempe intemperiem siccam, quod enim senium in sanis est, id sicca intemperies est in ægris. QUOD ut colligitur ex Galeno 7. meth. 5. Si in arthritide contingat luxatio, arthritidis aut difficilimè sanatur, aut prorsus est insanabilis: difficilimè quidem sanatur, si accidat luxatio, quòd de articulationis ligamenta sint madefacta, & laxiora reddita; quamuis enim articulus, qui excidit à cavitare, non diffi-
culty reponatur, arthritidis tamen hæc sanari non potest, nisi loca affecta comburantur, velut sæpe docet Hippocrates, & potissimum 6. aphor. ultimo. Insanabilis erit arthritidis, si quando fiat luxatio, quæ materia sit cavitare repleta, eaq; præsertim gypsea, non enim excidit articulus, & rursus incidit, ideoq; neque luxatio, neque arthritidis sanari potest, ut ex commento Galeni in aphorismum

propo-

positum colligi potest. nam quò articulus in
nitatem redeat, necesse est vt materia in cauita-
contenta prius euacuetur; quod minimè fieri
test, præcipuè si fuerit valde viscida, aut gyp-

*igna prognostica arthritidis differentiarum, quæ à cau-
sa efficiendi capiuntur. Cap. 31.*

Arthritis ex pituita viscida curatu est difficilli-
ma, quoniam in hac maximè omnium depra-
tur retentio, in omni quidem arthritide reten-
longior est, quàm naturalis status postulet; ve-
m eadem multo est longior in arthritide ex pi-
ta viscida, quoniam hæc materia adeò adhæret
eis articulis, vt vix ab eis separari queat. Qd
materia fuerit non solum viscida, sed etiam gyp-
a, de ea sic Hippocrates, secundo libro prædictio-
um. Quicumque aut senes sunt, aut circa arti-
culos callos tophaceos concretos habent, aut
rumnosè viuunt, aut siccam aluum habent, hi
sanes fieri sani non possunt arte humana, quan-
ego noui. Hos igitur soli prognostico relin-
quendos ducimus, vtpotè arte medica incurabi-
s, quamuis ope naturæ aliquando curentur, qñ
delicet alui fluxiones laudabiles subsequuntur;
uemadmodum quoq; superueniente fluxu vri-
æ albæ, & crassæ quamplurimi ab articulo-
etibus imminentibus præseruantur, vti docuit
Hippocrates 4. aphor. 74. Verum iuuenis laboris
mator ratione victus optima vtens, aluū hūme-
tam habens, si medicum sibi prudentem elego-
it, arthritide ex pituita genita non gypsea libera-

bitur. Nunc ad arthritidem sanguineā veniamus de qua Galenus 10. de compos. medicamentorum secundum loca ca. 2. dicit, quod quemadmodum raro fit arthritis ex sanguinis multitudine, ita tiffimè venę sectione curatur. Idcirco libro de curandi rōe per sanguinis missionem cap. 15. inquit Memini me ischiadas vno die facta ex ciure euacuatione curasse, nimirum vbi non ex frigore, sed impletis sanguine, quæ in coxa sunt, venis, prouenissent. Quinimo non solum sanguinis euacuatione arthritides curantur sanguineæ, sed quib. spiratur abscessum ad articulos futurū, si vrina repleta multa, crassa, & alba, ex naribus quoque sanguis eruperit, breui admodum solutio fit, vt colligitur ex Hippocrate 4. aphor. 74. Auicēnas lib. 22. cap. 6. de arthritide biliosa loquens, dicit eam citò mortem attrahere, & præsertim apud regimen plurimum: hæc enim ipsius sunt verba. Nonnulli existimarunt Auicennam loqui de arthritide ab attrahibile profecta, verborumq; Auicennæ hunc esse sensum, hanc arthritidem esse lethalem; quorum interpretatio sequentibus verbis Auicennæ confutatur, subdit enim; & præsertim apud regimen multum. falsum namq; est arthritidem attrahibilem esse lethalem, præsertim quando ægri rectè reguntur. Alij voluerunt Auicennam loqui de arthritide biliosa, vt sensus est arthritidem biliosam esse lethalem, & præsertim quando curantur ægri stupefaciētibus, atq; repetentibus materiam ab articulis ad partes principales. Verū huius sententiæ confutatio non diffi-

facilis illud intuenti, loqui nempe Auicennam
 loci de optimo regimine seu custodia, non aut
 eo, quo ab ignobilibus partibus ad principes
 belluntur humores. Ego verò, vt dicam quod
 tio, arbitror Auicennam loqui de arthritide
 iosa, illudq; sibi velle, arthritidem biliosam ci-
 attrahere mortem, hoc est citò extingui, seu de
 edio tolli, & potissimum qñ ægri optimè regū-
 : quæ sententia non est Auicennæ propria, sed
 cum Hippocrate, à quo accepit, cōis. Hippo-
 crates enim in libro de affectionibus hæc habet
 rba: arthritidis ex bile, & pituita brevis quidē est
 orbus, & acutus, non autem lethalis. quod autē
 oc loco affirmat Hippocrates de arthritide ex
 e, ac pituita commixtis, idem multo magis lo-
 m habet in arthritide tantum biliosa, dummo-
 qui ea laborant optimè regātur. Arthritidis me-
 cholica quemadmodum rara est, ita vix, aut ne
 quidem arte vlla curatur.

*Signis prognosticis ischiadis cuiusdam sententia Hippo-
 cratis explicatio, explicationis aliorum confutatio. Cap. 32.*

Quamuis ischias dolor sit vehementissimus,
 quoniam ex sententia Hippocratis libro de
 fectionibus, coxæ iuncturam, summas nates, ac
 xendicem obsidet, adde etiam q per crus vni-
 rsu diffunditur; quæ partes tot ac tantæ cum
 quisito sint sensu præditæ, extensiuè, & intensi-
 doli acuto sunt obnoxia; nihilominus alijs
 ticulorum doloribus difficilior non est curatu,
 inimo facilius longè q̃ chiragra, aut podagra
 rari solet. nam cōis omnium consensus, adeoq;

experientia ipsa sæpe docuit, clysteribus acri-
bus, quos pharmaca purgantia ingrediuntur,
chiadem esse sublatam; de podagra, aut chiraga
nihil vnquam tale legimus. nec mirum, quand
quidem purgantia medicamenta è coxis, vtpo
partibus proximis materiam leui negotio elici
atque extrahunt; è partibus verò remotis non
ne summa difficultate materiam educunt. Est se
tentia Hippocratis quarto in sexto epidem. re
tertio, repetita etiam in fine libri de humoribu
si doloribus articularibus intestinorum à dext
parte superuenit dolor, reddit ægrum quietior
posteaquàm verò is curatus est, erat dolētior. G
lenus confutatis prius veterum interpretationi
bus concludit nomine intestini dextri esse inte
ligēdum colon; duasq; affert causas, cur superu
niente dolore colico articulari æger fiat quietior
altera est, quia dolor maior superueniens min
tenebras offundit, auctore eodemmet Hippoc
te 2. aphor. 46. est autem dolor colicus articul
maior, ideoq; æger quietior redditur. Altera
causa, quia transposita materia ab articulis ad i
testinum colon, dolor articularis remissior fit,
æger redditur quietior. Nōnulli alioquin doct
simi Galeni interpretationem reprehēdunt, p
mum quia licet dolor maior superueniens min
rem obscuret, non tñ æger redditur quietior,
dicit Hippocrates, sed magis excruciat. de in
quia materia in articulis semel deposita, non n
difficillimè ad intestina deflecti potest. quare m
lius exponi Hippocratem volunt ad hūc modum

si intestinum colon dolet, eum, superueniente
dolo articulari, quietiorem reddi. quàm ipsorū
intētiam duplici ratione muniunt, tum quia fa-
lis est materiæ ab intestinis ad articulos fluxio,
extra Paulum, qui lib. 3. cap. 43. in quadam consti-
tutione sui temporis factum id affirmat; tū quia
erè dicitur quietior fieri, qui dolore magno, cu-
iusmodi est colicus, transit ad minorem, qualis est
articularis. Hæc interpretatio, si quid ego iudico,
mente Hippocratis tam est aliena, quàm quæ
alienissima. Etenim falsum est minore superueni-
ente dolore, videlicet articulari, maiorem obscu-
ari, nempè colicum; vehementior remissiorem
obscurat, non contrā. Præterea minore dolore
maiori superueniente non est rationi consenta-
eum, è loco magis dolente ad locum minus do-
lentem humorem attrahi. Adhæc non dicit Hip-
ocrates ægrum quietiorem reddi, quod dolor
magnus transeat, seu permutetur in minorem, sic
nim verisimile esset hanc permutationem ex co-
lico in arthriticum fieri; sed dum vnus dolor alte-
ri superueniret, æger erat quietior; postquam ve-
rò is curatus est, fuit dolentior. quare voluit sub-
euarum fuisse ægrum, dum dolor alter alteri sub-
ungeretur, non autem dum ex maiore in mino-
rem fieret transitus. Quare seposita aliorū inter-
pretatione concludo cum Galeno Hippocratem
de vnus eiusdemq; doloris nempè articularis le-
nitione loquutum fuisse; quamuis enim dum re-
missiori dolor superuenit intensior, simpliciter si
loquamur, æger non tam subleuetur, quam affli-

gatur; secundum priorem tamen dolorem quies
 tior dicitur reddi, quoniam prior minus animad-
 uertitur, conuersoq; impetu causæ suæ ad locum
 magis dolentem mitior etiam re ipsa euadit. Ad
 obiectiones contra Galeni interpretationem al-
 latas respondemus, Hippocratem non dixisse, su-
 perueniente dolore colico ipsi articulari, simpli-
 citer ægrum subleuatū; sed articulari minus fuisse
 exagitatū. Præterea non est impossibile, immo
 neque difficile, ut materia, quæ aliquandiu arti-
 culis insedit, ad intestina deflectatur. quemadmo-
 dum enim Paulus in mala quadam Italiæ consti-
 tutione plures ex dolore colico in arthritidē in-
 cidisse tradit, fluente nempe materia ab intestin-
 colo ad artus; ita docet Hippocrates loco supra
 citato, senes podagra correptos tophacea, super-
 ueniente fluxu alui per sanari. Quare quemadmo-
 dum ab intestinis ad articulos, quod contingere
 sæpe solet in dysenteria, fluit humor, desinitque
 dysenteria in arthritidem; ita etiam humoris flu-
 xio ab articulis ad intestina facit, ut superuenien-
 te fluxu alui arthritidis ipsa euanescat. hoc autē ac-
 cidere solet in articulis coxæ præ ceteris omnib;
 ut qui proximi sint intestinis, facileq; inde defle-
 ctat ab ipsis humor, quo ischias curetur. quæadmo-
 dū verò fluxu alui spontaneo superueniente, ischia-
 di nullus locus relinquitur, ita optimè superius cō-
 stituimus eādem clysterum acrium ope, qui pur-
 gantia medicamenta in se recipiant, sanari posse

Signa prognostica podagra, & chiragra. Cap. 33.

Hippocrates libro de affectionibus podagram
 dicit

licit esse morbum chronicum, & consequenter
ceteris doloribus ægrius curari. cuius rei rationē
bidem reddit, quoniam videlicet materia eò dif-
ficilius eximitur, quò residet in locis frigidiorib⁹,
densioribus, solidioribus; maioreq; corporis ne-
cessitate constitutis. quam quidē ob rē cum diffi-
cilimē materia podagrā efficiēs tollatur, propte-
rea omnium, qui in articulis consistunt, morbo-
rum maximē violentus, ac diuturnus ducitur, æ-
greq; cedens ab Hippocrate vocatur. Galenus 6.
de tuenda valetudine 7. podagram negat esse le-
thalē, sed adeo diuturnā esse affirmat, vt homines
ad mortē vsq; comitetur. quo loco hominum no-
mine nō oēs cuiusuis ætatis cōplexus est, sed illos,
de quibus loquutus est Hippocrates 2. aphor. 40.
nempē valde senes, malamq; victus rationem ser-
uantes. qui enim non admodum consenuerint,
in ijs podagræ curatio intra dies 40. absoluetur, si
modò medico non aberranti æger morem gesse-
rit. quemadmodum non solūm tradit Hippocra-
tes 6. aphor. 49. sed luce clarius demonstrat Gale-
nus in commento. Quod dictum est de podagra,
idem in chiragra dicendum, nempē morbū valde
diuturnum esse, qui vt plurimum senes ad mortē
vsq; comitetur; in iunioribus verò dūmodo nul-
lus committatur error, 40. dierum spatium termi-
nari. Si cui morbi articulares sunt ingenti, is ab ijs
dem, præcipuē verò podagra liberari omnino ne-
quit, Hippocrate teste secundo prædictionum.
Nonnulli insitam habent articulorum imbecilli-
tatem, eam tamen dolor nō necessariò subsequi-

tur, auctore Galeno 6. aphor. 28. Ad arthritidem autem generationem non modò articulorum imbecillitas, sed etiam fluxio desideratur; fluxio vero nunquam excitabitur, nisi quid in victu is deliquerit, qui in arthritidem propendet.

De indicatis à dolore, & anodynis distrahentibus. Ccp. 34.

IAm de natura indicantium omnium ad arthritidem attinentium quàm potuimus accuratissimè, prætractauimus arthritidis. n. definitionem, oēs illius causas, atq; differentias, denique illius, suarumq; differentiarum signa tum demonstratiua, tum prognostica in mediū protulimus; nūc quæ auxilia, quas auxiliorum materias, quamque administrationem arthritidis indicantia postulent, exponemus. Quod ad primum attinet, inter alia, quæ rationem indicantis subeunt, ipse dolor articularis sese offert, qui quatenus symptoma, videlicet tristis sensatio tensiua, nihil indicat, seu nullo eget remedio; docuit enim Galenus 12. meth. 1. & 7. symptoma, quatenus tale, non indicare; indicat tamē dolor articularis, quatenus habet rationē causæ; quæ causa fuit, vt arthritidem non solum sub rōe symptomatis, sed etiam causæ definiremus. Indicat autem articularis dolor vehemens, non leuisculus; vehementis porrò doloris, quemadmodum & causæ omnis indicatio ad prouidentiam spectat, auxiliumq; ab eo indicatum anodynum dicitur, id est, dolorē emulcens. Ex anodynis alia leniunt dolorem distracta facultate sensitiua ab obiecto dolorem excitante, quoniam reuocant facultatem sentientem ad sui cognitionē, & consequē-

sequenter eam distrahunt à cognitione alterius. Huius generis anodyna vel simpliciter sunt talia, vel mixtam habent naturam ex anodynis, & molestiam inferentibus. Simplex anodynū est facultatis adiudicantis obiectum valde iucūdum; quapropter medici iubent ægros, qui vehementissimis doloribus torquentur, cum amicis de rebus iucūdis sermones serere, atque ad alia, quæ oblectent, totos se conuertere. Vnde Galenus 1. de tuenda sanitate cap. 7. tria anodyna commemorat, puerorum demulcendis doloribus maximè accommodata, quæ facultatem eorum sensitivam à cognitione obiecti molesti distrahant, papillam nempe nutricis ori puerorum inditam, motum medio-crem, & vocis modulationem. Obiecta itaq; valde incunda sunt simpliciter anodyna, quæ facultatem sensitivam à cognitione obiecti iniucundi auertunt, eamq; ad sui cognitionē rapiunt. Mixta anodyna omnia facultati sensitivæ molesta. inter hæc dolor vehemens recentetur, de quo dictū est ab Hippocrate 2. aphor. 46. vehementiore dolore languidiorem obtundi, ac obscurari. dolor maior minori superueniens, quatenus priorem obscurat, anodynum dici potest; quatenus verò molestiam infert, potius contrarium anodyno. Illud tamen est notandum dolorem vehementiorem in eandem partem, quam mitior occupat, insipientem, nullo modo anodynum dici posse, quippe qui dolorem adauget, non imminuit; sed is dolor vehemens anodynū nomen meretur, qui nō parti minus dolenti superuenerit, sed alteri ab ea di-

uersa, vti colligitur ex Hippocrate, & Galeno citato loco; ex quorum pariter sententia nos supra docuimus, dolorem colicum articulari superuenientem, articulare obscure. Inter mixta anodyna recensentur animi vehementes perturbationes, quæ quidem dolorem priorem occultant, & molestiam inferunt, quales sunt timor, & ira. Si quis enim dolore vehemente detentus videat domum comburi, præ nimio ignis timore dolorem non animaduertit; & qui vulneratur ab inimicis, nimia ira, furoreque perciti, vulnus illatum, ex eoque dolorem non persentiunt.

De anodynis sensum omnino tollentibus. Cap. 35.

PRæter anodyna distrahentia facultatem sentientem à cognitione obiecti molesti, de quibus diximus, sunt & alia, de quibus nunc est dicendum, quæ vel sensum dolentis partis omni ex parte tollunt, vel minuunt, vel æqualem reddunt. Primi generis remedia etsi anodyna dicantur, reueratamen anodyna non sunt; sed eodem planè modo in genere causæ efficiētis dicuntur anodyna, quo Galenus 5. simpl. ca. 19. hominem mortuum anodynōn vocari posse putat, quod dolore vacet; vacat autem dolore, quia sensu caret; sic illa dolorem auferunt, quia sensum unà adimunt, unde etiam stupefacientia appellantur. Hæc remedia, cum ad differentiam distrahentium non agant immediate in facultatem cognoscitiuam, neque eam distrahant à cognitione alicuius obiecti, sed tanquam vehementissimè frigida auferant calorem naturalem

ralem, quo facultas sensitiua utitur ad operationes suas exercendas, propterea dicuntur quoque auferre sensum. est enim nervosarum partium calor modicus, quo fit ut inter frigidas partes corporis recenseantur, earumq; calor non difficulter frigidis admodum medicamentis tollatur; dum .a. nervosarum partium tollitur temperamentum calidum, quod est instrumentum praeipuum facultatis sentientis, haec proculdubio facultas obstupescit, ideoque ne sentire quidem, nedum dolorem pati, potest.

De anodynis sensum minuuntibus, & aequalem reddentibus. Cap. 36.

A Nodyna sensum obtundentia leniunt dolorem, quoniam cum sint valde humida, siccitatem auferunt, quo ad operandum nervosae partes velut instrumento minus praecipuo utuntur. est .n. nervosarum partium siccitas adeo remissa, ut citra controversiam remedijs valde humidis removeri possit; cum etiam inter nervosas partes sentientes nervi non sicci, sed humidi dicantur. Quare haec anodyna humida cum siccum tollant temperamentum, quod simul cum calore facultatem sentientem fouet, ac quodammodo exacuit, dicuntur quoque eandem facultatem obrundere, adeo ut dolorem non persentiat vehementem. Anodyna sensum aequalem reddentia proponuntur a Galeno 5. simpl. c. 19. ubi dicuntur esse calida in primo, vel temperata, & tenuium partium; dicuntur autem sensum aequalem reddere, quoniam spiritum animale, vel eius radium, caloremq; , qui

in partem admodum dolentem plus æquo influ-
xit, discutiunt. Ad partem. n. valde dolentem non
solum tota facultas ducitur influens, sed etiam e-
ius spiritus, vel radius, necnon calor influens; quo
factum est, vt sæpe experientia docuerit in parte
dolenti opposita fieri paralyfin facta nēpe facul-
tatis influentis, spiritusq; animalis, eiusūe radij
nimia ad partem valde dolentem fluxione. exem-
pli gratia, accepto vulnere in sinistra parte capi-
tis, contingit paralyfis, in dextra; qm̄ verò spiritus
animalis, eiusūe radius, qui nimium ad locum do-
lentem confluit, est in causa, vt facultas sensitua
obiectum doloris insigniter percipiat, propterea
eget medicamento discutiente, seu euaporationē
sui efficiente, quod quidem est anodynum calidū
in primo, vel temperatum, tenuisq; substantiæ,
quodq; nuncupatur anodynum æqualē reddens
sensum; si quidem eundem nimis adauctū, nimis-
que acutum imminuit, atque remittit, ac conse-
quenter æqualem naturali reddit.

Quæ sint anodynorum vera indicantia. Cap. 37.

CONSTAT ex ijs, quæ dicta sunt, quatuor esse a-
nodynorum genera; alia distrahentia faculta-
tem sentientem, alia stupefacientia, alia obtun-
dentia, alia facultatem æqualem reddentia, hæc
omnia remedia doloris ab eodem quodammodo
indicari dicuntur, quia dolorem sedant, eius cau-
sa relicta. Quis propriè si loquamur, doloris indi-
cata dici non debent, cum neque immediatè tol-
lant dolorem, neque vt plura ab vno indicari pos-
sint, quòd vnicum ab vno indicetur Galeno atte-
stante

stante 9. meth. 12. 11, meth. 13. libro de optima se-
sta ad Thrasib. capir. 23. & 45. Præterea quod
vnum idemque indicet, auxilioque immediatè
subleuetur, vt docet idem Galenus 3. meth. 1. qd
verò ad ablationem alterius aufertur, non indicat
remedia, eodè Galeno teste 12. meth. 1. quare hæc
anodynorum genera non possunt indicari à do-
lore, sed distrahentia à facultate sentiente, quæ di-
strahitur; stupefacientia, quæ sunt vehemèter fri-
gida, à calore, seu temperamèto calido partis sen-
tientis, quo per ea, quæ sunt valde frigida ablato,
stupore quoq; afficitur facultas sensitiva, & dolor
sedatur. Obrudentia indicantur à sicco tempe-
ramento partium sentientium, quo sublato per
ea, quæ valde sunt humida, obtunditur quoque
facultas sensitiva, dolorq; mitior redditur. Ano-
dyna æqualem sensum efficiëntia indicantur à spi-
ritu animali, eius ve radio, qui immodicè ad locū
dolentem confluxit, ad cuius ablationem sensus
iam factus acutior nonnihil hebescit, & naturali
redditur æqualis. Nunc quæ dicta sunt, ad arthri-
ridis curationem accommodemus. Articularis
dolor vehementissimus anodynis stupefacienti-
bus compescendus, nedum alijs anodynorum ge-
neribus: qui verò minus est vehemens, anodynis
quibuscunque, præterquam stupefacientibus,
sedandus est. Omnium anodynorum materias in
sequentibus subijciemus.

De remedijs præseruatiuis. Cap. 38.

AD remedia prædicta accedunt sanantia, quo-
rum nonnulla à causis, alia à morbis ad arthri-

tidem attinentibus capiuntur. Arthritidis vero
 causa cum sit vapor, humor, aut corpus solidum
 quaecunque tandem illa fuerit causa, corpori ad-
 uersatur, vel substantia, vel quantitate, vel quali-
 tate, vel loco; nam motus omnis cōiter sumptus
 in quatuor prädicamentis reperitur, nempe sub-
 stantia, quantitate, qualitate, & vbi. quare si ma-
 teria fuerit à tota substantia aduersaria, qualis est
 materia tophaceæ arthritidis, indicat remedium
 omnino auferens; quod dici debet detrahens, si
 quidem eius materia est solida, gypsea; solidorum
 autem propria est detractio, teste Galeno 3. in 6
 de morbis vulgaribus 2. Sin autem materia consi-
 deretur, quatenus redundans efficit arthritidem
 tunc ea si fuerit humor, oritur indicatio euacuā-
 di; sin flatus, discutiendi: quemadmodū enim de-
 tractio est solidorum propria, ita euacuatio liqui-
 dorum, iuxta Galeni sententiam loco citato, nec
 non 4. aphor. 2. & libro ad Thrasib. c. 25. quibus in
 locis disertis verbis affirmat quālibet euacuatio-
 nem à materiæ redundantia indicari, utpote illi
 contrariam. quemadmodum verò remedio sensi-
 biliter euacuante eget humor redundans, ita in-
 sensibiliter euacuans, seu discutiens auxilium va-
 por superfluous postulat. Hęc triplex causa, humor
 nempe, vapor, & substantia solida, si cōsideretur
 ut aduersatur corpori arthritico secundum qua-
 litatem, indicat alterans, verbi gratia calida, ut bi-
 lis, indicat auxilium refrigerās; frigida, ut pituita
 calefaciens; & dura, ut tophacea, emolliēs. Quod
 diximus de hisce alterantibus, idem plane de reli-
 qui

nis remedijs alterantibus, quæ ad partem pro-
nylacticam pertinent, est dicendum, hæc videli-
et totidem esse, quot sunt causæ nostro corpori
cundum qualitatem contrariæ. Si consideretur
ateria, ut aduersatur corpori secundum locum,
ateria hæc proculdubio non est materia, quæ
abuerit, vel habeat ad loca cõuenientia integrè
inclinationem, quia hæc corpori non aduersatur
cundum locum, sed vel iudicata est, vel iudica-
ur, & consequenter remedio nullo indiget, iuxta
hippocratis sententiam 1. aphor. 20. Quæ iudicā-
ur, & iudicata sunt integrè, neque mouere, neq;
ouare & cætera. Itaque si arthritidi superueniat
luxus alui, quo integrè moueat humor, aut mo-
is sit, nihil ex arte tentandum, sed naturæ totum
pus est relinquendum, utpote soli huius arthri-
dis sanatrici. Verum materia nocens corpori se-
undum locum, habet inclinationem ad motum
on conuenientem, qui quidem vel est diminu-
us, vel deprauatus; si habuerit inclinationem ad
notum diminutum, indicat remedium adiutias,
quemadmodum docet vnà cum Hippocrate Gal.
apho. 11. Si arthritidi sanguineæ superueniat im-
minutus fluxus sanguinis narium, vel si eam pa-
atur mulier, cui diminutè menses fluant, cui du-
ium, quin mensium, & sanguinis narium fluxus
iminutus promouendus sit, quemadmodum do-
et Gale. 9. meth. ca. 9. Verum si materia habuerit
d motum deprauatum inclinationē, indiget di-
ertente, quod quidem auertens, transponens, &
ransferens nuncupatur à Gal. 1. aphor. 11. vbi hæc

E

habet verba: si inclinatio ad motum praua fuerit prohibere, transferre, atque diuertere oportet. Hoc auxilium, cum communissimum sit, de omni avertente prædicatur, siue id reuellens, siue deriuans, siue etiam percutiens fuerit. diuersio autem que ita latè patet, vt ad reuulsionem, deriuationem & percussionem se extendat, teste Gal. 4. meth. 2. & 5. meth. 3. Vtrum, 2. reuellens, deriuans, percutiens sint tria inter se auxilia diuersa, potius vnum, idemq; auxilium, quod de varijs materijs, varioq; materialium vsu prædicetur, ex quo quæ postea dicemus, elucescet. De remedijs ad uidentiam attinentibus vnum illud adijcimus varia esse diuertentia pro materijs, quæ diuertere debet, diuersitate: verbi gratia diuertens vaporem diuertens humorem, idque aliud atque aliud pro humoris diuersitate; diuertens corpus solidum idque pariter variū pro corporis solidi varietate.

De remedijs curatiuis.

Cap. 39.

Remedia curatiua totidem in arthritide loca habent, quot sunt morbi, qui ad eam pertinent. Morborum ad arthritidem pertinentium autem in locis reperiuntur, à quibus fit fluxio; alij in loca ad quæ fluxio defertur. exempli gratia, in capite frigido generata pituita, quæ subinde ad articulum decurrit, cui dubiū, quin caput sit calefaciendum eodem modo si ex intemperie calida iecoris generetur bilis, quæ arthritidem producat, quis videt iecur esse frigefaciendum? Idem de quacunque alia intemperie partis, aut totius corporis vnde manat fluxio, sentiendum; inde videlicet

ri indicationem alterandi per contrarium; quæ
eiusdem quatenus desumitur ab intemperie, ve
l causa continente actionis læsæ, curatiua indicatio
habetur; quatenus verò ab eadem tanquam ar
thritidis causa sumitur, indicatio præseruatiua est
nuncupanda, quemadmodum enim Galenus 4.
meth. 3. & 4. necnon 5. meth. ca. 1. indicationē de
sumptam ab intemperie vlceris fouente præserua
tiuam nuncupat, ita nos quoque indicationem
sumptam ab intemperie alicuius partis, vel totius
corporis arthritidem fouente, præseruatiuā esse
statuamus. Quod dictum est de intemperie totius,
ut partis, à qua fit fluxio; idem est pronuntiandū
de intemperie partis, in quam recipitur. ex æquo
nim hæc, quatenus fouet arthritidem, auxilium
alterans præseruatiuum; quatenus verò est causa
immediata actionis læsæ, curatiuum auxilium in
dicat. quinimo quotquot alij morbi arthritidi ad
nectuntur, causæ nomine possunt insigniri, hæcque
de auxilium indicare præseruatiuum, dummodo
indicandi facultatem habeant. Nam si Galenus 4.
meth. 4. tumorem intemperatum, aliosque mor
bos causas vlceris iunctas appellat, quare nos den
tationem, siccitatem, luxationem, atque alios arti
culorum morbos causas arthritidis non appella
uimus? & si causæ debetur indicatio præseruatiua,
quid vetat affirmare, morbis causæ rōnem habē
tibus indicationem conuenire præseruatiuam?
Quapropter dicimus siccam in arthritide intem
periem, quatenus causa continens deprauatæ re
tentionis existit, auxilium humidum curatiuum

exigere; quatenus verò fouet arthritidem, præseruatiuum expostulare. Pari modo dum arthritidis calida iungitur intemperies, hæc, vt causa depuratiuæ attractionis frigidum auxilium curatiuum vt fouens arthritidem, præseruatiuum indicat. de his morbis diximus, idem de alijs intellectum volumus, nepe cōtraria indicare, quæ diuersa præseruatiua, & curatiua dici possint. Arthritis proinde annexa intemperies humida, qua loci articulorum ad suscipiendum idonea reddantur, remedium siccum indicat: frigida intemperies, qua locis articulorum densatis tollitur expulsiuum remedium calidum. Animaduertendum modo, quamuis in loco dolente semper magnitudo æstus, & compressio reperiatur, nonnunquā etiam obstructio, & morbus in cavitatibus; ab his tñ morbis nulla desumitur indicatio, quando quidem ablationem suarum causarum auferuntur, cuius tamen quod remedium indicat, ad ablationem æstus terius non tollatur, iuxta Gal. 12. meth. 1. verum morbus in raritate, aut dēfite, q̄ aliquādo arthritidi adhæret, indicat proculdubio, alter auxiliu densans, alter rarefaciens. Quoniam verò indicatio à virtute desumpta in arthritide locum non habet, quòd virtus indicet sibi simile, aut ea prohibeat, quæ à morbo, morbiq̄ue causa indicatur, sed solum quatenus eadem indicata coindicat, vel permittit; idcirco de indicatis à virtute desumptis ne verbum quidem hoc loco faciendum duximus.

Ad. dyne

*Anodynon sensum reddens aequalem, quatenus tale,
doloris causam non auferre. Cap. 40.*

antequam ad materias auxiliorum, earumque
re&um vsum accedamus, duo sunt è medio
enda dubia. Primum anodynum calidum in i.
du, aut temperatum tenuisq; substantiæ, non
etur esse anodynum, sed sanans quiddam; do-
em, n. nō sedat relicto affectu, sed affectu sub-
o vnā tollit dolorem. Nā humores redundan-
euacuat, acres obtundit, crassos attenuat, va-
res discutit, poros nimium densos rarefacit, a-
que eiusmodi præstat, quibus primum morbos
causas tollere, deinde dolorem sedare videtur.
de Argentarius libro suo de consultandi rōe
præter stupefaciens se nunquā aliud anody-
m cognouisse fatetur; in quo sanè plurimū ab-
auit, tum quia extant alia tria anodynorū gña,
quia stupefaciens ipsum ppriè nō est anodinū
potius ex dolorem leniente, molestiamq; in-
ente auxiliū quoddā mixtum, stupore inducto
lorem sedans. Quare quāuis anodynū calidū,
uisq; substantiæ humores redundantes eua-
et, acres obtundat, crassos attenuet, cæteraque
estet teste Gal. 5. de simpl. medicamentorum fa-
tatibus c. 19. ea tñ præstat quatenus auxilium
ans, non anodynum, qm̄ dolorem sedat mor-
& causa sublatis, nō relictis. Propriè aut nū-
patur anodynum, qm̄ spiritum, qui plus æquo
locum dolentem confluxit, & facultatē nimis
quisito sensu præditam fouet, discutit, æqualē-
e facultatem facultati secundum naturam se

habēti reddit. Altera dubitatio est eiusmodi, ut
 scilicet in arthritide locum habeant suppurantia
 Ex loco quidem Galeni citato de simp. medicam.
 facultatibus c. 19. ubi scribit reperiri nonnulla
 nodyna, quæ similiter in corpus nostrum ac pu-
 mouentia agant, videtur colligi posse, nonnun-
 ad arthritidis curationem pus mouentia esse ad-
 hibenda. Contrà Actius lib. 3. sermone 4. c. 12. op-
 ptimè statuit, nunquam in arthritide pus mouen-
 tibus esse utendum, q̃ in hoc affectu nec mater-
 suppuratiōi idonea, nec causa ipsius effectrix re-
 periatur. Siquidem materiæ, quò in pus vertatur
 requiritur apta quædam dispositio, quā nusquam
 inuenias; quippe quæ sit ut plurimū pituitosa, a-
 p̃pterea frigida & humida, quæ difficilimè in pus
 vertitur. Adde q̃ temporis progressu eam viscid-
 tatem, duritiēque contrahit, ut in tophos cōcre-
 eat. Causa effectrix ipsius in pus conuersionis non
 solum est temperamentum calidū & humidum
 sed etiam redundans corpus calidum & humidū
 quod ab Hippocrate, & alijs calidum innatum et
 nuncupatum. Vtraque autē conuersionis in pus
 effectrix causa in arthritide deest, velut in affectu
 partium, quæ inter calidas & humidas, calidoque
 innato redundantes reponi non consueuerunt
 sed potius inter frigidas & siccas, quæque calido
 innato carere videntur. Cum itaq; in morbis ar-
 ticularum materia in pus conuerti nequeat, id
 circo suppurantia non conueniunt; ut quæ lice-
 quatenus temperata, & viscida, temperamentum
 affectarum arthritide partium, earūque calidum
 inan.

tum cōseruent, nihilominus ad conuersionē
 us efficiendam nihil adiumēti afferre possunt.
 are Aetius non solum pus non esse mouendū
 arthritide optimē constituit, sed etiam ijs, quæ
 aleno dicta sunt, aduersatur. Nam et si statuatur
 enus nonnulla eorum, quæ propriē anodyna
 untur, perinde in corpus nostrum ac pus mo-
 ntia agere, nō propterea voluit hæc duo reme-
 rum genera eiusdem esse facultatis, sed solo
 nperamento sibi inuicem similia, alioquin dis-
 ilia; cum anodyna nihil prorsus adstrictionis
 bere debeant, ne si pars quidem, aut affectus id
 ooscat; pus verò mouentia vim habeant poros
 struendi necesse est, vt calidum innatum affe-
 rum partium cōseruent. Iure igitur optimo
 arthritide pus mouentia sunt interdicta.

*materijs remediorum in genere, & Vena sectionis tum
 inuentione, tum quantitate. Cap. 41.*

Emediorum materiæ omnes in triplici sunt
 differentia; aliæ ad chirurgiam spectant, aliæ
 pharmaciam, aliæ ad diætā; de quibus omni-
 nis ordine proposito dicemus. Inter chirurgicas
 aterias primum sibi locum vēdicat venæ sectio,
 iæ quidem est semper materia auxiliij euacuato-
 idque vehementis, & consequenter indicati
 ultitudine sanguinis valde nocētis. Cum enim
 opus cuiusque euacuationis sit humoris multi-
 do, indicans proculdubio sanguinis euacuandi
 it eiusdem sanguinis multitudo; quod verò in-
 cat auxilium vehemens sanguinis euacuatoriū,
 ultitudo sanguinis actu, vel potentia valde no-

centis fuerit. Quapropter non solum Gale. 10. d. compoſ. ſecundum loca ca. 2. ſed Paulus, Aetius
 atque vt vno verbo dicā, omnes in arthritide ſan-
 guinea, aut in qua a deſt ſanguinis redundātia, ſan-
 guinem eſſe euacuandum exiſtimarunt. Vbi ver-
 bilis, non. a. ſanguis redundat, Auicennas ſangu-
 nis euacuationē interdicit, qm̄ ſanguine euacua-
 to bilis tenuior, adeoq; fluxioni aptior efficitur.
 Tempus oportunum ſecandæ venæ Aetius 3. te-
 rrabilium ſermone 4. c. 22. & Gal. 6. apho. 47. ver-
 & autumnum eſſe voluerunt, non ignari hiſce an-
 ni temporibus non tam redundare ſanguinem,
 plus æquo ad articulos ferri conſueuiſſe. Ideoq; ar-
 thritidi obnoxios ab eadem, venæ ſectione præ-
 ſeruandos eſſe. In euacuatione verò arthritidis
 monet Aetius, quotieſcūq; dolor articularis fue-
 rit vehemens, ſiue ante cibum, ſiue à cibo, venam
 ſecari oportere; hac tñ cautione adhibita, vt vrgē-
 te dolore ante cibi in ventriculo coctionē, prius
 vomitus excitetur, deinde vena ſecetur. Eſt. n. ma-
 teria alimentalis in vētriculo exiſtens, ſi cum ſan-
 guinis multitudine arthritidem efficiente confe-
 ratur indicans prius electum; qm̄ illius tanquam
 cauſæ ſine qua non, prius per vomitum, quā huius
 per venæ ſectionem euacuation eligitur. Verum cū
 venæ ſectio non tantum ſit materia auxiliij totius
 corporis euacuatorij, ſed etiam partis affectæ, p-
 pterea Aetius 1. c. 4. ſermonis 3. libri, dolorem co-
 xēdicum à multitudine ſanguinis obortum venæ
 ſectione curandum cenſet: venæ quidem cubiti,
 ad euacuationem totius; venæ verò in malleolis

aut

ut poplite sita, ad euacuationem partis affecta,
empe coxa. Idem ante Aetium faciendum iudi-
cauit Galenus x. de compos. medicamen. secundū
ca c. 2. cuius sentētiæ ea meritò ratio reddi pōt,
cōmodè sanguis è parte affecta nequeat educi,
nisi prius q̄ in toto corpore redundat, euacuetur.
Hinc colligi pōt semel, atque iterum in arthritide
tundi venam oportere; id q̄ fatetur Aetius ex p-
ria sententia loco citato, atque ex sententia Phi-
lorgij 4. serm. lib. 3. c. 33. neque sanè mirum cū vir-
us in arthriticis tantam sanguinis euacuationem
unica vice non sustineat, quantam totius corpo-
is plethora exigit; ideoq; quantum sanguinis re-
dundantis vires ferant, extrahendum; q̄ superest
reperita venæ sectione euacuandum, postquàm
doneis alimentis virtus non nihil recreata fuerit.
Hæc verò euacuandi ratio dicitur per epicrasin
facta, qua non semel, & vniuersè quod redundat
euacuatur, sed paulatim, atque ex interuallis aut
horarum, aut dierum, prout virium instauratio
tibi boni succi procuranda postulat. Hinc etiam
colligitur, q̄ dum sanguis valde redundat, multa
eiusdem vacuatio necessaria est, dummodo virtus
non facilè exoluatur. Vnde Philargius refert hi-
storiā arthritici cuiusdam sanguine valde reple-
ti, qui ob multi sanguinis euacuationem liber ab
arthritide euasit viribus etiam integris. Hoc autē
putamus Philargium ab Hippocrate mutuatum
esse 1. aphor. 3. vbi colligitur, idque ex sentētia Ga-
leni in commento, quantitatem euacuationis nō
solum ex redundante sanguine desumi, sed etiam

ex virtute corporis euacnādi. Vbi ergo mult^o abundat sanguis, virtusq; euacuationē tolerat, multus est euacuandus: vbi verò sanguis parum redūdat, aut virtus sanguine valde redundāte, largam effusionem non fert, modicè euacuandum. In arthritide virtus plerunq; satis est valida ad mediocre sanguinis profusionem tolerādam; si quando tamē arthritici constitutio debilior est, quā vt vel leuem euacuationē sustineat, profectò sanguinis euacuatio ne tentanda quidem.

Qua Vena in arthriticiū secanda. Cap. 42.

PERCEPTA mittendi sanguinis quantitate, locus modo inquirendus, in quo secari vena oporteat. Galenus lib. de curādi rōe per sanguinis missionem c. 18. vbi renes aut partes infra renes sunt affectæ, iubet venas poplitis, aut malleolorū secare: venā verò cubiti, si partes renibus superiores laborent. Hinc constat ischiadem, gonagram, & podagram sectis venis inferioribus curari debere. Galenus se plures ischiadas incisa vena in talo, aut poplite, vno, eodemq; die curasse, parum abest quin gloriatur. Chiragra verò cum cæteris superiorum partium articularibus morbis vena cubiti secta curanda est. Cum his, quæ iam diximus, pugnare fortasse videbuntur locus quidam Galeni, & alter Aetij. Galenus. n. x. de compos. medicam. secundum loca ca. 2. ischiadas curandas esse existimavit à cubito primum facta sanguinis detractio. Aetius item lib. 3. sermone 4. c. 1. & 12. censet nō solum in dolore coxendico, sed in gonagra, & podagra venas cubiti; in chiragra verò, alijsq; partiū super-

uperagnarum arthritidis differentijs venas inferio-
res secandas esse. Verum qui loca citata paulò al-
ius introspexerit, caputque secundum secūdi ad
Glaucōnem diligenter perlegerit, hæsitare desi-
net. Nā sectione venæ vel vniuersum corpus e-
uacuari, vel pars affecta debet: si totius corporis
facienda euacuatio, vena parti affectæ proxima
non est secanda; si è loco affecto euacuatio moli-
enda, cōtrā vena parti affectæ proxima secari pōt.
quare dum afficiuntur partes inferiores, pro eua-
cuatione totius vena cubiti; dum afficiuntur su-
periores, vena iuxta talos, aut poplitem est secan-
da. Qñ verò extrahendus est sanguis è loco affecto,
partibus supra renes laborantibus, vena brachij,
partibus infra renes, aut renibus ipsis, vena circa
talos, aut poplitem est incidenda. Neque igitur
Galenus à se ipso, neque ab Actio vllō pacto dis-
sentit. Quoniam verò sectione venæ totius cor-
poris euacuatoria, reuulsio quoque cōis fit, ideo
in controuersia vocatur, secanda ne sit vena eius-
dem lateris cum loco affecto, an potius oppositi.
Aetius c. 23. seruandam esse rectitudinem tradit,
ita vt in gonagra cruris dextri, aut pedis dextri po-
dagra brachij dextri vena pertundatur, non autē
sinistri. Galenus 2. ad Glauc. c. 2. in omni reuulsio-
ne seruari vult rectitudinem. Auicennas c. 7. cita-
to sic scribit: oportebit, vt administres phleboto-
miam ex parte contraria. quibus quidem verbis
Aetio, aut Galeno minimè aduersatur, licet id fa-
cere videatur. Mutuatus est hanc sententiam Aui-
cēnas à Galeno libro artis medicinalis capite pē-

ultimo, vbi præcipitur, vt in omni reuulsione ad maximè oppositas partes fiat retractio. Id quod seruata rectitudine sine dubio verissimum est. Exempli gratia, affecto genu dextro vena cubiti dextri secanda, non sinistri: affecto genu sinistro, vena sinistri cubiti non dextri. In arthritide totius, qua laborant oēs articuli, præcipit Auicennas, vt vtriusque simul cubiti vena secetur, quod non magis è dextra, quàm sinistra parte, sed ex omnibus corporis partibus equè fiat sanguinis euacuatio. Præterea vt vena vnius cubiti secta, per eam tanquam per locum affecto proximum sanguis eliciatur; secta vena alterius cubiti diuertatur. Quod si vniuersi corporis articulis affectis, alij tñ magis, alij minus torquentur; nos cum Celso in cubito lateris minus afflicti venam aperiendam esse existimamus. Quanquam non abs re omnibus articulis laborantibus, hæmorrhoidibus hirudines possunt applicari, quemadmodum qua sequuntur, demonstrabunt.

De cucurbitulis, & hirudinibus. Cap. 41.

AEtius affixam cucurbitulam magnam coxæ dolenti ad curationem doloris coxendici commendat. Ea siquidem materiam morbificam, quæ in hoc affectu valde interna est, ac proinde difficulter euacuatur, ad circumferentiam pertrahit, quod vbi materia peruenerit, è corpore illico educitur. Confert multum etiã cucurbitula sine scarificatione, igne tamen coxæ applicata, quàm insensibiliter, licet non euidenter locum dolentem euacuat. Probantur quoque hirudines dolenti loco appli-

applicata. De vtrisque autem, hoc est cucurbitu-
 is, & hirudinibus, illud diligenter animaduerten-
 dum, neutras ante totius corporis euacuationem
 loco affecto esse applicandas. Vnde Galenus pro-
 curatione ischiadici doloris non esse scarificanda
 erura existimauit x. de compos. medic. secundum
 loca c. 2. nisi prius facta totius corporis conueni-
 enti euacuatione. Hirudinum denique hoc pro-
 prium, vt hæmorrhoidibus applicata, commodè
 corpus vniuersum euacuare possint. Hoc vsu ve-
 nit, quando oēs articuli afficiuntur, veremurque
 ne brachij, vel pedis secta vena, materia ad pedē,
 aut brachium affectum rapiatur; tunc enim hiru-
 dines vtilissimè hæmorrhoidibus applicantur, v-
 niuersumque corpus per eas euacuant. Nam etsi
 sanguinem in summo tantum corpore existentē,
 adeoque proximum euacuare consueuerint, tñ
 ijs sublatis, viæ, quas hirudines ictibus suis con-
 fecerunt, fomentis apertæ possunt seruari, & cu-
 curbitula magna eisdem applicari, quæ sanguinē
 etiam è toto corpore abundè eliciat.

De extractione Varicum, & earum incisione. Cap. 40.

AEtius c. 24. ad præseruandum aliquem à po-
 dagra sanguinea, ex sententia Ruffi varicum
 extractionem proponit, cuius beneficio sangui-
 nem non amplius in articulos pedis influxurum
 podagræque pariturum censet. In aliarum verò
 partium articulis, vtpote coxendicis, cubiti, & si-
 milium, fluxione intestatis venæ cum valde non
 appareant detrahi minimè debent. Animaduertit
 tñ Auicennas lib. 3. fen. 22. tract. 1. c. 5. post vari-

cum extractionem partes ipsis proximas, velut pedes, nutrimento priuari, & contabescere Galenus de atra bile c. 5. ex varicum sublatione melancholiam sæpè produci testatum reliquit. Quare cum varicum detractiōi tm̄ periculi impendeat, satius est earum plurimas fieri sectiones, & postea cicatrices, quibus vię tā angustę reddantur, ut denuo redundans sanguis per varices permeare nequeat. Cum. n. Galenus 13. meth. ultimo, parte vasorum excisa, aut etiam totis altè præcisis, duraque cicatrice introducta, sistendam ad oculos fluxionem esse docuit; cur non licebit, vbi ad articulos redundans humor defertur, varicesque valdè appareant, earundem partem aliquam excidere, aut etiam totas alte præcidere; ut cicatrice induc̄ta partiumque continuitate sublata, ex alia in aliam, & tandem in articulos iterum humor non influat?

De combustionibus. Cap. 45.

INter chirurgicas operationes non solum Hippocrates 6. aphor. ultimo, sed alibi sæpè, & omnes alij medici Hippocratem sequuti combustiones proposuerunt. Combustionibus autem humor qui ad articulos confluit, consumitur, tum fluens diuertitur. Hippocrates loco citato, & Aetius c. 25. ijs vti sunt humoris causa, qui affluit. Fiūt exustiones vel cauterijs, vel causticis medicamētis; his tñ minus rectè, quā illis, q̄ ignis citius, ac validius humorem consumat, plusque roboris ac firmitatis articulis conferat, quā medicamenta facultatem igneam habentia. Verum

com-

combustiones non in quacunque arthritide locū habent, quia in arthritide biliosa, sanguinea, aut serosa non reperias à quo auxilium, cuius materia sit ignis, vel medicamentum causticum, indicetur: adde quodd biliosa, sanguinea, & serosa arthritidis, vti superius demonstratum fuit, non sunt adeo pertinaces, vt ad ignem, aut caustica medicamenta sit confugiendum. Multò verò minus in arthritide tephacea locum habent cōbustiones, de qua peruagatum est illud Poetę, soluere nodosam nescit medicina podagram. In mucosa quidē arthritide duplex reperitur indicans eius auxilij, cuius materia sit ignis; pituita nempe mucosa, & laxitas affectarum partium hæc enim consumi, illa coarctari postulat; ignis porro præstat vtrumque, consumens quod mucosum, quod prælaxū est, coarctans. Combustionum duo sunt genera; alia externa, quę in superficie sola fiunt; alia interna, quę vsq; ad articulos submucidos pertingūt. Hæc mukum magis absument, laxitatemq; coarctant, sed minus tuta sunt, quod inde vlcera insanabilia prouenire soleant. Siue autem externæ siue internæ fiant combustiones, ex omnium medicorum sententia præstat partes comburendis proximas adstringentibus medicamentis prius communicare, ne ab intensissimo ignis calore, doloreque vehementissimo inde profecto redundans humor nimium attrahatur. Partes insuper adurendæ prius medicamentis valde frigidis stupefaciendæ, quo minorem ex combustionem dolorem persentiant. Combustiones siquidem tan-

tus dolor interdum comitatur, ut inde syncope
 suboriatur. Quod si æger cauteria reformidet, me-
 dicamentis causticis inurendus; inter quæ vni-
 commendatur radix iberidis recens, optimè con-
 tusa, cum adipe suillo permista, parti que dolent
 applicita, quamuis. n. ad tollendam potius inue-
 teratam ischiadem, quàm ad reliquos articulo-
 rum dolores curandos conferre videatur, nihilominus
 ad omnes diuturnos dolores è medio tollendo
 experientiæ testimonio magnam vim habet. Quæ
 re non solum Aetio 3. retrabiliū sermone 4. c. 2.
 vsus huius medicamenti mirum in modum pro-
 bat, sed etiam Galeno ex sententiā Archigenis x.
 de compos. secundum loca c. 2. Non desunt & ali-
 lia, & quæ laudentur, lac ficuum & tithymali, alliū,
 cæpa, sinapis, sterco caprinum, columbinum, &
 similia, quibus non solum partes in tumorem at-
 tolluntur, sed etiam exulcerantur. Cantharides
 præparatæ cum sinapi, fermento, & aceto squil-
 litico permistæ cōiter administrari solent. Vehe-
 mentius autem, citiusque comburunt olea non-
 nulla destillata, utpote de sulphure, de calchanto,
 & similia. Quæ validiora sunt medicamenta, ut ci-
 tius suum opus perficiunt, ita citius quoque de-
 bent amoueri. Quam ob rem olea proposita, &
 radix iberidis trium aut quatuor horarum spacio
 applicata conseruari debent: longiore .a. tempo-
 re alia, post inustiones siue cauterijs, siue medica-
 mentis factas, crusta seu eschara, quæ superest, au-
 ferenda; deinde infarciendis medicamentis, aut
 etiam septicis vlcera conseruanda, quousque ma-
 teriis

eria mucosa fuerit consumpta. Præter inustiones
 volenti loco adhibendas, ut mucosus humor, qui
 fluxit, consumatur, aliæ quoque fieri consueue-
 unt ad diuertendum humorem iam influentem,
 quæ nuncupantur ab omnibus cauteria, ab instru-
 mento quo parari solent, nomine indito. Fonti-
 culi quoque dicuntur, quia per eas tanquam per
 fonticulos fluere solet humor assidue. Itaque si de-
 luat humor à capite per spinalem medullam &
 neruos in varios corporis articulos, cõuenit cau-
 teriũ in occipitio, quo eius fluxus intercipitur, &
 edundantia imminuitur. Hoc cauteriũ quando-
 que setaceum nuncupatur, mutuato nomine à
 lictione italica [seca] qua sericum vulgo significa-
 tur; inde funiculus paratur, quo setaceum, ut vo-
 cant, seruatur apertum. Consuevit itidem fieri se-
 taceum in occipitio ad humorem, qui ad mandi-
 bularem articulos decurrit, reuellendum. Si fluat
 humor ad brachium sinistrum, ad eius diuerten-
 dam fluxionem fieri potest fonticulus in dextra:
 Sin humor ad crus, vel pedem sinistrum cõfluxe-
 rit, in eundem finem fiet aptissimè fonticulus sub
 crure dextro. Quando verò cauteriũ faciendum,
 quomodo, quandiu seruandum, & vnum ne, an
 plura facienda, non lubet curiosius persequi, ne
 in re parum difficili prolixiores fuisse videamur.

De frictionibus oleo salito administrandis. Cap. 46.

TRanseamus ad alias operationes chirurgicas,
 inter quas Galenus 2. de simpl. medicament.
 acul. ca. 18. & Aetius ca. 21. quarti sermonis libri
 tertij proponunt frictiones, quæ sale cum oleo

F

permisto fiant. Omnib. enim (inquit Aetius) hoc modo fricantur, insitus calor augetur, quod præter naturam est, discutitur, recrementa quæ sumuntur, & affecta membra fiunt robustiora, & amplius eorum doloribus non sint obnoxia. Aetius, attestante Galeno loco citato. quibus quidem verbis non solum proponuntur facultates olei saliti, sed etiam colliguntur indicantia, quæ auxilia respiciunt, cuius materia sit oleum salitum ea verò sunt quatuor: insitus calor imminuitur, vapor præter naturam adauctus, excrementi humor redundans, & partium affectarum laxitas, quibus omnibus indicantibus oleum salitum veluti materia multiplici facultate prædita cum latè satisfacit; quippe quod diminutum calorem nativum adauget, vapores adauctos discutit, redundantia excrementa consumit, partesque iuxta laxiores coarctat. Quæ cum ita sint, superest modus, ut quando, quomodo, & ubi hac materia utendum sit, intelligamus. Tempus igitur utendi oleo salito opportunum erit, quando prædicta indicantia oleo salito possunt adiuuari; quod fieri nequit quoadiu dolores vigent; nam ex oleo salito factæ cutis constipatione vehementiores euaderent, maiorque tum attractio humorum, & vaporum ad locum doleantem, quam conueniat, tum attractorum detentio fieret. Quare conuenit usus olei saliti, ubi articulares dolores se se remiserint; tum enim ex oleo salito prædicta indicantia fructum utilitatemque percipiunt. Quod si æger sicco admodum fuerit temperamento, nequaquam hominem oleo

leo salito inungere licebit, ne fortè in grauiora
ricula præcipiteretur. Præarida siquidem intem-
peries remedium indicat perquam humidū, quo
su olei saliti administratio neglecta iacet. Vbi
erò adsunt quæ oleum salitum indicent, nihilq;
quod prohibeat, tunc illius vsus frequēs erit, præ-
cipiente sic Actio ex sententia Philargij, singulis
tempè diebus, mane & vesperi, idque per oēm vi-
am, præcipuè verò articulis natiua imbecillitate
borantibus, quæcum difficilimè corrigatur, vt
item vel non augeatur, vel si fieri potest, mitior
iam reddatur, sæpe repetitis ex oleo salito inū-
tionibus per oēm vitam est vtendum. Quod ad
modum vtendi attinet, fiet inunctio ex oleo pro-
posito cum frictionibus, quo illius vis intrò defe-
atur; nam alioquin exiguo aut planè nullo qua-
lor indicantibus prædictis erit adiuumento. Quo-
ritur conferat inunctio olei, substantia ad inter-
as partes deferenda est, quod sine frictionibus
eri minimè potest, cū oleum sui visciditate ob-
ruat, sal verò adstringat. Loca, in quibus frictio-
es ex oleo prædicto administrandæ, sunt pedes,
tura, manus, omnes denique partes articulis p-
mæ. Ex quo sequitur non modò in podagra, sed
iam quacunque alia arthritidis specie huiusce-
modi frictiones ex sententia Galeni administran-
as esse. De remedijs chirurgicis hætenus.

De materijs pharmaceuticis, et anodynis stupefacientib. c. 47

RECTUM vsum materialium ad pharmaciam at-
tinentium nunc edocturi, simul etiam quæ nã
t medicamenti cuiusque compositi pro articu-

lorum laborantium diuersitate necessitas, apemus. Inter materias pharmaceuticas alia sunt nantis auxilij materiae, alia auxilij anodynorum. Per habitis autem ijs, quae distrahentis anodynorum materiae, ut quae ad diætam potius, quam pharmaciam spectent; dicimus materias, de quibus noster sermonem instituimus praeter nimiam frigiditatem stupefacientes esse. Conferunt itaque plurimum quando dolores articulares fuerint vehementissimi, idque siue calida, siue frigida fuerint loca affecta, & siue toto corpore expurgato, siue non dolores enim vehementissimi habent rationem indicantis urgentis, in quod, speretis omnibus alio medico incumbendum est. Neque modò pauper laboranti stupefacientia licet extrinsecus applicare, verum etiam intrò assumenda exhibere. Per materiam alio atque alio modo mensuraque administrantur. Exhibentur namque in forma potionis, boli, & pillularum. Vbi articulum dolores non admodum resistunt, sufficit, ut in potione exhibeantur; si verò stupefacientibus non cile cedant, non solum in bolo, sed etiam in forma pillularum praebenda. In potione praebere potest succus seminum papaueris albi, cuius maximum pondus est ℥ i. minimum ℥ s. mediocre ℥ syrus de papauere tum simplex, tum compositus, & syrus de nymphæa in forma potiorum in maxima mensura ad ℥ 2. in minima ad ℥ i. in mediocri ad ℥ i. s. exhiberi consueuerunt. In forma boli uti consueuimus philonio Romano requie Nicolai, theriaca, & mithridatio recentiorum quorum

orum maxima dosiſt eſt ꝓ i. minima ſcroꝓ. i. &
diocris ꝓ s. pap. Conſueuimus quoque vti pil-
is de cynogloſſa pariter à ſcroꝓ. i. ad ꝓ i. inter
terias auxiliij ſtupefacientis extrinſecas Hip. 4.
nor. 25. proponit aquam frigidam hiſ verbis:
mores articulorū atque dolores frigida aqua
gè effuſa ſoluit, notādum tñ eſt cum Galeno in
nmento aquam frigidam, quatenus quod in-
xit, reꝓerꝓutit, eſſe materiam auxiliij ſanantis,
n anodyn: anodyn: verò eſſe materiam, qua-
uſ ſtuporem inferit. Aqua igitur effuſa actu fri-
a eſt vtendum, quia loca affecta ab aqua vel a-
calida, vel tepida, etſi poteſtate frigida, nō ſtu-
funt. Eadem de cauſa copioſa debet eſſe quæ
unditur, quia modica inſperſio aquæ frigida
porem non inducit. Præterea quo ſtupefaci-
s medicamentum ſit ad agendum efficacius,
æſtat vt in forma craſſiore exhibeatur, qualis
huius compoſiti medicamenti forma. Rec. o-
g. 4. lactis muliebris ꝓ i. olei anethi ꝓ i. s. ceræ
rum, miſce ꝓ linimento. Vt .a. conſtet huius
medicamenti compoſiti neceſſitas, illud ſciendū
ꝓ, opium eſſe medicamentum in hac compoſi-
one præcipuum; quod quia ſyncerum obeſſet,
agis enim refrigerat quàm conueniat, ideo in-
cat ſibi admiscēdum quidpiam, quod illius vim
frigerandi infringat atque refrænet, cuius me-
camenti materia lac ſtatui poteſt, & oleum ane-
inum. Præterea quamuis opium valde ſtupefa-
at, foris tamen applicatum quia nequit proprijs
tibus ad partes internas permeare, poſtulat ſibi

admiseri aliquid pro vehiculo, cuius medicamentum materia est oleum anethinum. Insuper opiū cum prædicto oleo & lacte permistum minus agit, quam conueniat, quia cum sit valde fluidum, in loco affecto hæreere & contineri nequit; unde permiscendum est cum aliquo medicamento, cuius opere parte laborante non excidat, sed crassitiē acquirens inibi sistatur; qualis medicamenti materia est cera. Neque incommodum est triphera magnā requiem Nicolai, vel philonium Romanū oleo violaceo aut nenupharino, succo ve nymphæe & lactucæ dissoluere, dolentiq; loco applicare. Verum tum quia post stupefacientium extrinsecam applicationem partes nimium refrigeratæ permanere solent, quandoquidem stupefacientia hæc mixta anodynis constant, quæ vt partim dolore leniunt, ita partim molestiam ex intemperie frigida inducunt; idcirco Aetius ca. 31. post extrinsecam cum stupefacientiū vsum monet præclare adtumescere, si pars refrigerata calicis emplastris foueatur, de quibus in præsentia non est dicendi locus, quod de anodynis nunc sermo instituitur.

De materiæ auxilij anodynæ sensum obtundentiæ & æqualem naturali sensui reddentiæ. Cap. 48.

PRæter medicamenta stupefacientia, inter anodyna recensentur quæ sunt valde humida & calida in 1. gradu, aut temperata, & tenuis substantiæ. Horum aliqua intro assumpta partim medicamenta, partim alimenta existunt; de quibus propterea anodynis tum demum verba faciemus, ubi ad partem diæticam peruenerimus. Hic lo-

externorum anodynorum est proprius, quo-
rum materiae ut plurimum sunt olea, pinguedines,
adipes, succi, Inter olea anethinum, chamæmeli-
num, amygdalarum dulcium, oliuarum matura-
rum, in loco recens, seminum lini, sesaminum, & alia hu-
iusmodi commendari solent. Inter pinguedines
canina, gallinacea & anserina. Inter adipes vitulinus,
caninus, caprinus: ex succis fœnegræci, tragi, mal-
uarum, matris violarum, & similium succus. Un-
de compositum medicamentum præscribas ad
curandum hunc modum Recip. olei anethini amygdalarum
dulcium añ 3 i. succi maluarum 3 i. s. oui luteum,
Misce pro linimento. Duo sunt in hoc composito
principalia medicamenta, oleum nempe anethi-
ni & amygdalarum dulcium, quæ quamuis sint
anodyna, illud æqualem sensum reddens, hoc sen-
sum aliquantulum obtundens; nihilominus cum
sunt aeræ substantiæ, velut omnia olea, ideoque
facile inflammantur, propterea cum medicamē-
to aqueæ substantiæ permiscenda, quod eis pro-
pensionem ad inflammationem adimat; quem in-
veniem cum oleis succum maluarum commiscui-
mus. Denique quoniam olea sibi postulant admi-
seri medicamenta crassæ substantiæ, quorū parti-
culæ applicantur, tenaciter adhæreant; tum levia
anodyna cum sint, vehementiora euadant: idcir-
co oui luteum insupet adiunximus. Medicamen-
tum maximè anodynum est cremor ptisanæ hor-
deaceæ decoctæ in aqua maluarum cum oleo oli-
varum recenti permixtus. Hæc de anodynorum
materiis.

Quot leniētia genera, tū de vomitorijs, atq; clysterib. Ca. 49

EX sanantis auxiliij medicamentis, nonnullæ totum corpus respiciunt, quædam partes affectas quæ totum corpus respiciunt, triplicia sunt: lenientia, præparantia, & purgantia. Quamuis. n. lenientia humores in ventriculo, intestinis, alijsq; partibus proximis existentes tantum educant, non autem eos, qui in remotioribus locis consistunt; totum corpus respicere tamen dicuntur, quoniam eductis, quæ in locis citra iecoris portam hærent, excrementis, humores ultra iecoris cauam siti facile tum præparantur, tum purgantur. Inter lenientia reponuntur vomitoria, clysteres, glandes, medicamentæ umbilicaria, & quæ per os assumpta aluum laxant. Itaque Aetius & Galenus ex sententia Archigenis vomitoria summopere commendant, non solum ad curandum ischiadem, sed etiâ gonagram, podagram, aliosq; dolores articulorum, potissimum verò quando à ventriculo & intestinis ad articulos fluunt humores; aut in articulis coxæ reperiuntur, non tamen impacti; tunc enim non solum diuerſi, sed etiam per vomitum euacuari possunt. Excitatur vomitus oxymelite simplici & composito, succo raphani, quem vnicè laudat Rases, decocto genistæ cum agarico quodam non præparato, cum iure verò pingui permixto. Præ cæteris omnibus oxymel scylliticum cum iure permixtum ad vomitum excitandum valet. Aretæus in casibus prædictis ad vomitum ciendū elleborum exhibet. Quibus verò vomitus non est difficilis, ante assumptum cibum; quibus difficilis

post prandium vel cœnam vomitoriũ præberi
debet; idque frequenter, quoniam probabile nõ
est, ut bis terve vomitu excitato materiam posse flu-
entem reuelli, quæque in articulis coxæ reperiuntur
non impacta educi. Per clysteres quoque a-
liæ res eadem materia deriuari & euacuari potest;
quorum quidam sunt, qui ex decoctione vtriusque cen-
turij radicum, cucumeris asinini, corticis secun-
dæ sambuci, & consimilium fieri consueuerunt.
Exempli gratia Recip. foliorum vtriusq; centau-
ri, ebuli añ m. s. colloquintidis ʒ 2. foliorum iux,
saluarum añ m. i. vini albi potentis q. s. Fiat deco-
ctio secundũ artem, deinde Rec. dictæ decoctio-
nis lb. i. mellis rosati solutui ʒ 3. hieræ Logodionis
ʒ 3. olei rutacei, liliorum alborum añ ʒ i. i. salis ʒ i.
misce pro clystere. loco hieræ prædictæ possumus
tiagarico trochiscato. Conuenit etiam elateriũ,
antimonium ad g. 4. vel 6. est etiam in frequenti
usu electuarium de benedicta ad ʒ i.

*De Umbilicaribus, glandibus, aliumque lenientibus
per os assumptis. Cap. 50.*

GLandium & umbilicarium medicamentorũ
usus tum potissimum utilis est, ne dicam ne-
cessarius, quum ægri à frequẽti clysterum usu ab-
horrent. Parari possunt glandes ex melle ad ignẽ
concreto cum sale & medicamentis à propieta-
te attrahentibus cõposito, verbi gratia, in fluxio-
ne biliosa, cum diagridio; in pituitosa, cum collo-
quintide, & consimilibus. Multa autem ab Aetua-
rio, Aetio, & Paulo proponuntur umbilicaria, q̃
ex validissimis purgantibus confici debent, quale

est vnguentum Agrippæ Regis, cuius descriptionem apud Nicolaum Alexandrinum reperias. Aprissimè quoque sic præscribas: Recip. succi cyclamini, cucumeris agrestis, secundæ corticis sambuci añ 3 2. Pulveris hellebori nigri, colloquintidis añ 3 1. mellis parum, misce pro linimento. Qd vmbilico applicitum purgat quidem, non tamen vehementer, ita vt potius inter lenientia, quàm purgantia recēseri debeat; quemadmodum quoque nonnulla assumpta cum à partibus tantum proximis attrahant, nequaquam remotis, lenientia dici possunt. Hinc Auicennas in arthritide biliosa proponit cassiam, tamarindos; quibus adiungi potest syrupus rosaceus solutius. Si arthritidis ex serosa pituita gignatur, probatur manna: si ex pituita crassa, vel melancholia, mel rosaceum solutium, electuarium, & id genus alia administrari debent, de quorum usu ne verbum quidem facio, quoniam non magis ad arthritidē, quàm ad quēvis alium affectum huiusmodi tractatio spectare videtur. Illud tamen de cassia animaduersione dignum arbitror, synceram cassiam in arthritide biliosa non esse exhibendam, quoniam etsi bilē intestinis proximam educat, nihilominus simul etiam laxat; quod dum præstat, facit vt materia ad articulos delata, eorum imbecillitatem facilè adaugeat, quare cassiæ vis relaxandi tamarindorum admittione coercenda est.

De preparantibus, & purgantibus. Cap. xi.

AD præparandam materiam biliosam probantur syrupus rosaceus recens, è cichorio tum
sim.

simplex, tum compositus, è cichorio cum rhabar-
paro, de endiuia, de portulaca, de nymphaea, alij-
que consimiles cum decoctionibus proportio-
natis. Ad præparationem humoris melancholici
syrupus è floribus boraginis, de buglosso, de me-
lissa, de pomis tum simplex, tum compositus, è lu-
pulis, è fumo terræ & id genus alii cum decoctio-
nibus proportionatis. Præparandæ pituitæ ido-
neum mel rosaceum, hydromel simplex, & com-
positum, oxymel, syrupus de duabus vel quinque
radicibus, de betonica tum simplex, tum compo-
situs, de praxio, & similia cum decoctionibus ac-
commodatis. Verum si materia doloris articula-
ris effectrix non fuerit vnius generis, præparabi-
tur syrupis ac decoctis, quæ diuersos humores si-
mul commistos respiciant. Quia verò plerunque
bilis pituitæ commiscetur, propterea iuxta Rasis
sententiam medicamentum præparas partim bi-
lem, partim pituitam respicientibus cõstabit. De
præparantium administratione illud cognitione
iuxta ac obseruatione dignum est, syrupos cū suis
decoctionibus primum simplices, mox compo-
sitos exhiberi oportere. Primum. n. humores min⁹
à ventriculo remoti, minusq; concoctu difficiles
præparandi; deinde qui magis à ventriculo distāt,
ægriusque coquuntur. Sed neque negligenda
hæc animaduersio, syrupos eum plurima deco-
ctione esse permiscendos, quò ad partes remotis-
simas nēpe articulos affectos deduci possint. Iux-
ta quoque syrupus vel decoctio cum præparantibus
permisceri potest, vt eius ope præparetur pituita

potissimum in articulis inhaerescens. Quare si arthritidis ex pituita & bilis commistione prodierit, sic medicamentum praeparans conficias licet. \mathfrak{R} . syrupi de hyssopo, de iua, de cichorio añ \mathfrak{z} s. decoctionis foliorum iua, hyssopi, cichorij, menta \mathfrak{z} 4. misce. Vbi materia fuerit optimè praeparata, purgantibus medicamentis est vtendum. Redundans materia biliosa purgabitur aptissimè electuario de psyllio, de succo rosarum, diapruno vel solutiuo ad \mathfrak{z} 3. vel 4. rhabarbarum quoque cōmendatur. Acrius etiam ad diagridium non veretur ascendere, hoc modo: \mathfrak{R} . pulpae cotoneorum \mathfrak{z} 3. decoctionis rosarum solutiuæ q. s. fiat infusio secundum artem, & facta expressione adde diagridij g. 6. misce, & fiat potio. Conueniunt quoque pilulae aureæ, arabicæ, ex rhabarbaro de hermodactylis minores. Ad purgandam verò pituitam vsurpantur pilulae de hermodactylis maiores, arthriticæ, fetidæ, & benedictæ, de sagapeno, ex agarico, hiera cum agarico, & consimiles. Probatur quoque electuaria quædam, vt hiera picra cum agarico, hiera picra composita, hiera Pachij. In portione medicamentum purgans ad hunc modum praescribi potest. \mathfrak{R} . agarici trochiscati \mathfrak{D} 4. mastice \mathfrak{z} 1. decocti iua q. s. fiat infusio & expressio secundum artem, deinde adde mellis rosati solutui \mathfrak{z} 4. misce, & fiat potus. Huius compositi medicamenti rationem sic reddas. Agaricus etsi trochiscatus purgat quidem pituitam, sed sæpe medicamentum non deiectorium, sed vomitorium videtur. Supernatat enim in ventriculo, ventremq; turbat,

rutbat, & vomitum excitat; quare indicat sibi permiscendum esse aliquod medicamentum, quo in fundo ventriculi detentus, deiectionum medicamentum euadat; quod commistione mastiches assequitur. Quia verò nondum purgandæ pituitæ facultatem è quapiam certa ac determinata corporis parte separatim obtinet, propterea vt ab articulis attrahat, adiuncta est insuper pro vehiculo iuxta decoctio. Verum agaricus ne sic quidē multam pituitam potest expurgare, cum ʒ 4. non excedat; ideoque addidimus mellis rosati solutiui ʒ 4. Quando fluxio ad articulos fit melancholica; probatur fenna, polypodium, elleborū nigrum, diasenna, cōfectio amech, pilulæ indæ, & alia medicamenta, quorum descriptionem consultò omitterimus. Ad purgādos humores mistos possunt vsurpari pilulæ coccia, sine quibus, de hiera simplici, de tribus, & alia quoque medicamenta purgantia in forma potionis, vel boli.

De repercutientibus. Cap. 52.

Medicamentorum, quæ ad locum affectum diriguntur, alia materiam, alia morbum affecti loci respiciunt. Ex loci affecti materiam respicientibus quæ materiam eò, vnde profecta est, repellunt, seu (vt fusius dicamus) quæ materiam à termino ad quem ad spaciū, per quod fluxit, repellunt; vel à spacio ad terminum, & quo fluxio primum manauit; repellentia seu repercutientia dicuntur. Quæ quò rectius administrentur, nosse prius oportet, cui loco applicanda, & quo tempore. Quod ad locum attinet, Gal. 10. de compo.

secundum loca c. 2. dixit in ischiade repercutientia coxæ affectæ non esse applicanda, quod ita si remediij materia applicanda, vt indicans inde fructum percipiat; materia autem ischiadem efficiens ex repercutientibus coxæ affectæ applicitis nihil adiumenti capiat, quoniam existens illa quidem in cute & musculis poterit repercuti ad ligamenta; quæ verò in ligamenti reperitur, ad cavitates articulorum tãquam partes valde profundas; verum in podagra, chiragra, & gonagra repercutientibus vti licet, quia materia in articulationib⁹ harum partium reperta ex usu repercutientium iuvare potest, quatenus videlicet ab ijs ad partes proximæ repellitur. Avicennas vtendum quidẽ censet repercutientibus, ita tamen vt humor non sit multus, aut crassus & viscidus. Nã in arthritide inquam per crisin alius definit morbus, quaque vel omnes articuli, vel plurimi afficiuntur, non est vtendum repercutientibus, quia in his affectibus materia redundat, ideoque præ sui copia ab articulis ad partes principes facile repellitur. Quod si fiat, in maximum vitæ discrimen ægrum adducit. Nihilo magis repercutientibus vtendum, qñ materia crassa est & viscida; pars .n. eius tenuior poterit quidem repercuti, quæ verò crassior & viscosa existit, maiorem ex percussione crassitatem, atque visciditatem consequitur, quo fiet, vt diutius hærens in loco affecto concreascit, tandẽque in tophos vertatur; non quidem eo modo, quo vehementer calicis, & siccis medicamentis gypsea reddi solet; haud aliter enim quàm ex luto lateres

ateres fiunt in fornace, per assationem ex medi-
camentis valde calidis, & siccis materia tophacea
redditur; verum dum pars tenuior humoris cras-
si & visceri repercutitur, id quod superest humo-
ris paulatim à debili calore indurefcit, & sensim
in tophos mutatur. Concludimus ergo in ischia-
le non esse vtendum repercutientibus, neque in
arthritide critica, neque in ea, qua omnes vel plu-
rimi articuli afficiuntur, nec denique vbi humor,
qui confluxit, fuerit crassus & viscidus, sed tū so-
lum, quum humor, qui chiragram, podagrā, go-
nagram, aliosque dolores articulares in genera-
uerit, exiguus tenuisq; fuerit. Qui simul si calidus,
repercuti pōt ex sententia Aetij pulpa panis aqua,
& aceto repleta. Aquam frigidam superius ex sen-
tentia Hippocratis, & Galeni demonstratum est
non modò medicamentum stupefaciens, sed etiā
repercutiens esse: ceterum cum condenset plus
equo, ac proinde leuiter solum repercutiat, indi-
cat sibi aliquid pro vehiculo admiscendum, cuius
ope ad partes interiores deducatur, vehementi-
usq; repercutiat: talis auxiliij materia est acetum,
aut succus limonis, vel citri. Sed quia acetum cum
aqua mixtum non validè repercutit, vtpote flui-
dum medicamentum loco affecto non inherens,
idcirco pulpa panis, spongia, vel linteum adiun-
gitur, quo aliquandiu in parte affecta detineatur,
& conquiescat. Infrigidans Galeni, vnguentum
rosaceum Mesues, oleum omphacinum, succus
granatorum adstringentium itidem repercutiūt.
Gal. ii. de simpl. medic. facult. capite de ouo, onū

integrum, sine cortice tamen, cum oleo rosaceo permistum repercutere asseuerat. Potest quoque non ineptè repercutiens sic parari: ℞. olei rosacei, omphacini, vini granatorum añ ʒ i. pulueris sandalorum rubeorum, boli armeni añ ʒ i. succi citri parum, misce pro repercut. Si fluxio fuerit serosa, & proinde frigida, licet cum Aetio uti pupa panis madefacta in vino austero, quod cū sycerum ducatur ad partes internas, non eget vehiculo, indiget tamen ut permaneat applicitum, ex pulpa panis acquirit. Commendatur decoctum nucum cupressi, gallarum immaturarum, balastiorum, & similium, hoc modo: ℞. olei mastichini, decocti cupressi añ ʒ i. pulueris glandiū quercus, nucum cupressi añ ʒ i. vini albi acidi parum misce pro repercutiente. Huius quidem compositioni medicamenti ratio quia nullo negotio ex predictis colligi potest, voluntario silentio prætermittimus; illud duntaxat de recta repercutientium administratione monuisse contenti, repercutientibus actu frigidis esse utendum, dummodo materia repercutienda sit calida. Itaque Hippocrate 5. aphor. 25. aqua actu frigida tumores articuli sanari tradit; quo loco tumores Galenus in commento calidos interpretatur. Vbi verò arthritis est pituitosa, repellentia non debent administrari actu frigida sed tepida. Diuersa hæc administrandorum repercutientium ratio inde proficiscitur quòd etsi validius repercuriat medicamentum actu frigidum, quam temperatum, vel calidum,

nihil.

nilominus prohibetur actu frigidum, quando
neruosa partes sunt iusto frigidiores: tunc enim
actu frigida repercutientia conuulsiones aliosq;
corbos ab Hippocrate s. aphor. 17. relatos facile
ariunt; neruosa autem partes in arthritide fri-
da nimium refrigerari nemini dubium est, ac p-
de in ea ab actu frigidis repercutientibus absti-
endum. calida verò ijs vti conuenit, quia tum ve-
ementer repercutiunt, tum à caliditate partium
neruosarum coindicantur potius quàm prohibē-
ur, vt quæ à partibus illis caliditatem abigant at-
ue amoueant. Accedit quod materia frigida, etsi
uatenus motu suo fertur ad articulos, egeat re-
percutientibus, quatenus tamen frigida eget ca-
dis, ideoque repercutientia debent administrari
actu calida; nam actu frigidorum assiduus vsus fa-
t, vt tenues humores, nedum crassi ita cogantur
etque concrecant, vt congelasse quodam modo
uideantur; similiter ac ab intensissimo frigore a-
qua in glaciem vertitur.

Erasli opinio de repercutientium vso rejicitur. Cap. 53.

Rastus in quatuor disputatione contra Paracel-
sum in podagra, & chiragra vix vnquā repel-
lentibus vtendum esse contendit. Primum quòd
cèt cutem contrahant, non tamen ex cauis arti-
culorum quicquam exprimant; deinde quòd re-
pulsio à partibus imbecillioribus ad minus debi-
s raro succedit. Nos contra existimamus in iisdē
affectibus conferre repellentia, quia vt ex cauis
articulorum nihil exprimant, at ex ligamētorum
externis partibus cuteque quicquid est tenue, ex-

G

primere possunt. Præterea ut natura à partibus debilioribus ad minus debiles materiam non repellit, ita medicamenta repellentia, ubi naturæ agendo præpollent, ipsa vel inuita id efficiunt. Subiungit Erasius ex repellentibus dolorem pedum & manuum augeri, fluxionemq; consequenter e promoueri; cui responsum volumus; conferre repellentia, si adhibeantur, quando non prohibentur à dolore, quod tum nec dolorem, nec fluxionem promouere possint; non prohiberi autem ab exiguo dolore. Verum si cui videantur repellentia dolorem quantumuis leuissimum adaugere, cum anodynis calidis in primo gradu tenuisq; substantiæ commiscenda sunt, quod repellentia modò, dolorem item non adaugeant; cuiusmodi fuerit medicamentum ex rosæ siccis & altheæ radice confectum decoctum, aut cataplasma. Neque obstat, quod dicit Erasius, à partibus ignobilibus, nempe manibus & pedibus, non esse reuocandos humores in venas: nam minus sunt ignobiles quàm cutis, glandulæ, aliæq; partes iusmodi: accedit quod etsi inter partes ignobiles reponantur, sunt tamen ad varios vitæ vsus per necessariæ; pedes quidem ad progrediendum, manus ad apprehendendum, & tangibilem omnium cognitionem percipiendam. neque aliquid imminet periculi, si non nihil humoris tenuis repellatur ad venas proximas, atque à proximis ad remotas, dum modo ad partes principes humores retrocedat. Neque si materia podagræ, & chirogræ magna ex parte inutilis est atq; excrementum.

propterea in pedibus & manibus consumi & cuti eam præstat, quàm in venas repelli; quia aqua ex parte potest esse alimentalis, suiç; redundantia articulationibus obesse, non autem venis. Quod autem dicit Erasius repellentia vtilitatem aculisse nunquam, nisi fortè sanguinem succum musculorum venas sub cute perreptantes de non prominentem reprimant; id quidem amplectimur, nõ nec nari conferre in super repercuentia, quòd sanguinem, qui è venis effluxit, aliqua ex parte exprimitur & repellat, ad de quòd sua adstringendi facultate non solum nimiam laxitatem articulationum è medio tollunt, sed etiam venis proximis repellentis strictis fluentem humorem intercipiunt, nec virtutem affectarum partium custodiunt; quidem per repulsionem & expressionem amouent, quod facultatem opprefferat, articulationum laxitatem corrigunt, quæ tandem facultatem nimium debilitauerat. Proponunt igitur, cõtrà quàm sentit Erasius, in podagra & chiragra repercuentia, eoq; magis, si cum medicamentis tenuis substantiæ permista adhibeantur, non syncera. Quocirca cataplasma Archigenis quinquefolij radicibus & malicorio confectum, de quo Aetius 4. sermone tertij tetrabilium c. 33. laudatissimum est. non quòd malicorium cum discutiente permisceatur, sed quoniam adiunctum quinquefolio pro vehiculo, altius corporis partes subit, eaq; ratione vehementius repercutit, quàm potest syncerum. Eodem modo Galenus 6. de cõf. medic. secundum loca c. 1. succum mororum

immaturorum cum croco & myrrha tanquam
vehiculis commiscet, quorum ope magis in in-
flammationibus oris repercutiat. Quid ergo nos ve-
nit in podagra & chiragra repercutientia cum tenui
substantiæ medicamentis commiscere, quo per-
tius opus suum perficiat? quinimo Galenum in
imitabimur, qui x. de compos. medica. secundum
loca in manibus pedibusq; pharmacis fluxione
repellentibus esse utendum censet.

De discutientibus. Cap. 54.

DE repellentibus materiam à loco affecto
tis superq; videmur nobis egisse: nunc de re-
soluētibus qua fieri poterit breuitate loquemur.
Resoluentium quæ materiam tenuem, & flatul-
tam resoluunt, discutientia nuncupantur; quæ cra-
ssam, & subduram emollientia. Discussientia non
nihil calida sunt etiam anodyna æqualem sensum
reddentia, qua enim ratione dissoluunt spiritum
seu radium spiritus animalis, qui nimium ad locum
dolentem confluit, anodyna; qua verò aperiri
extrahunt humores, & vapores, qui in alto con-
nentur corpore, discutientia, & insensibiliter
uacuantia dicuntur. Eiusmodi est, teste Gal. ii. sim-
plicium capite de vulpe, oleum vulpinum, con-
uenit quoque anethinum, chamæmelinum, ruta-
ceum, & oleum lumbricorum. His validiora sunt
discutientia tantum, non anodyna, ut oleum de nu-
ce indica Mesues, irinum, de castoreo, de costeo
Mesues, & de viperibus. De quibus illud notan-
dum, nunquam hæc valde calida, & sicca medica-
menta sincera esse administranda, quod citò ma-
teriam

iam resoluant tenuem, crassiorem forte com-
 rant, gypseamque reddant. Quare sibi minus
 ida admisceri postulant, quæ vim eorum cale-
 iendi, & siccandi hebetent nonnihil atque ob-
 scure, quæ pndant. Possunt itaque hæc cum succis, cū pin-
 edinibus commisceri, vertiq; in formam lini-
 menti; vt si butyrum rancidum cum pinguedine
 ac fluxione, oleo chamæmelino lubricato, & cū succo
 laudulæ permisceantur, fiet linimentum mo-
 ratè discutiens. Possunt quoque applicari me-
 dicamenta sub forma fomēti hoc modo: ℞. folio-
 rum saluiæ, origani, betonicæ, lauendulæ, lauri añ
 .j. florum roris marini p.j. pulueris, piperis, cin-
 momi, cimini añ ʒ i. fiat decoctio in vino gene-
 so, & facta expressione seruetur pro fomento,
 quo spongia aut lana succida repleta loco affecto
 applicetur. Sæpè etiam docuit experientia ischia-
 m flatulentem sacculis discutientibus repletis
 blatam esse. repleri possunt sacculi furfuribus,
 puluere iuæ, maioranæ, origani, & aromaticum, ve-
 ti piperis, pirethri, & similium, atque ad flatus
 discutiendos adhiberi.

De emollientibus Valdeque siccantibus. Cap. 55.

Mollientia à discutientibus facultate non dif-
 ferunt. sed in eo solùm, quòd hæc tantummo-
 do per halitum digerāt, illa insuper quod conge-
 rum est suo calore fundant. Vbi ergo in loco af-
 fecto durities aliqua insederit, administranda e-
 mollientia; inter quæ meritò recensetur oleū de-
 stillatum ex guaiaco, itidem ex luto Diui Bartho-
 mæi in agro Patauino; imò lutum ipsum ad e-

molliendum egregiè conferre videtur, quemadmodum lutum Diuæ Helenæ ad discutiendū potius valet. In primis ad emolliendum probantur emplastra, vt diachilon simplex, compositum de meliloto Gal. 10. de simplicium medicamentorum facultatibus commēdat emplastrum ex caseo antiquo, & iure cruris suilli salis, 11. verò libro ex coctis chleis integris contusis fieri emplastrum docet quo viscosus crassusque humor in alto contentus impensè deficcatur. Ipse vti soleo emplastro, quod duos tumores venereos trium aut quatuor dierum spacio consumptos vidi. Sic compositum ℞. lithargyrii ℥ 1. s. colocynthidis, elaterij añ 3 1. olei viperini, oliuarum antiqui añ ℥ 1. s. acetiaceri rimi ℥ 2. misce ad ignem donec emplastrum solidum, & splendidum euaserit, quo etiam vti licebit in præduris articulorum tumoribus. Verum imitandus necessariò Galenus, qui 2. ad Glauc. 4. de tumoris cuiusdam scirrhosi tractans curationem inquit se vicissim vsum fuisse modò emollientibus modò valde exsiccantibus, ita vt post administrationem bdellij, amoniaci, & pinguedinum, vsum sit medicamenti acetum acerrimum aliaque siccantia recipientibus; post quæ ad laxatiua iterum redijt. Prudentissimè quidem ille, nam fusis humoribus per emollientia, consultissimum est eodem quantum fieri potest consumere; vbi verò aliqua ex parte consumpti fuerint, emollientibus iterum colliquare, ne quando pristinam duritiem recuperent. Eiusmodi emollientia præcipua sunt cerata ex galbano, bdellio, amoniaco, resina terebinthina, &

anthina, & similibus, quæ præstat super tumores
articulorum posita semper detineri, nisi institutū
t loco medicamenti emollientis vti valde exsic-
cante, quod facere videtur Galenus 2. ad Glauc.
4. vbi dum vtitur suffimento ex aceto acerrimo,
b vsu emollientium abstinet. Suffitus exsiccans
ale ritè paratur. ℞. foliorum artemisiæ, centaurij,
auendulæ, abrotani, apij, brionia, mentastri, stœ-
ados, pulegij añ m. i. pulueris baccharum lauri,
hederæ añ ʒ i. vini albi generosi q. s. fiat decoctio
ad consumptionem tertiæ partis pro suffimento.
Excitabitur commodè suffitus decocto sensim in
apides ignitos iniecto, vel parato balneo sicco, vt
vocant, & lixiuio, à quo sursum latos vapores æ-
ger suscipiat. Conficiuntur quoque suffumigia ex
balneis naturalibus, quales sunt nonnullæ foueæ,
in quas ægri ad curandam podagram, ischiadem,
& reliquos articulorum morbos, partes affectas
immittunt, eleuatosq; vapores è balneis sulphu-
reis excipiunt. Impensè exsiccant foueæ Aponē-
ses agri Patauini, cuiusmodi naturalia balnea tum
in alijs Italiæ locis, tum apud exteris quoque na-
tiones multa reperiuntur. Possunt etiam balnea
parari artificialia ex lixiuio, alijsque exsiccantibus
prædictis. Auicēnas stillicidium in locū affectum,
quod ille embrocham vocat, ex oleo vulpino mi-
ris laudibus effert. Fieri solent stillicidia in com-
missuram coronalem, & ventriculum, non mo-
dò vt materia, quæ ab hisce partibus defluit, exsic-
cetur, sed partium etiam earundem intemperies
corrigatur.

De medicamentis extrinsecis morbum ipsum respicientibus. Cap. 56.

DE remedijs extrinsecis materiam arthritidis effectricem respicientibus abundè, ni fallor, differvi; nunc de ijs, quæ ad affectarum partium morbum diriguntur, pertractandū est. Non ignoramus autem medicamenta omnia discutiendi vi prædita, quatenus calida arthritidi frigida aduersari, morbique frigidi remedia dici posse; similiter quæ materiam arthritidis exsiccant, quatenus intemperiem humidam adimunt, illius esse remedia: nonnulla tamē potissimum morborum causa foris applicantur, de quibus nunc sermonem instituimus. Inter morbos partium arthritide laborantium nimia laxitas connumeratur, quæ quoniam adstringentibus emendatur, conuenit oleū salitum supra allatum; præterea vsus vinaceorum: quod si præter laxitatem articularum ager intemperie humida, & frigida laboret, vinacea administranda ex vino albo montano generoso. Sin potius laxitati annectatur intemperies calida articularū, possunt administrari vinacea ex vino rubro oligophoro. Quod antea diximus de tempore administrandi olei saliti, idem in vinaceis obseruandum. Si arthritidis fuerit frigida, vinum probatur generosum, in quo decoctum sit castoreum, quoniam vtrumque, præcipuè verò vinum, Galenus 4. de tuenda sanitate ca. 4. in podagra alijsque articularum affectibus commendat. Hæc de medicamentis externis satis.

De medi-

*De medicamentū tam frigida quā calida arthritidis
intrinsecus. Cap. 57.*

Nter alia medicamenta quæ extrinsecus admi-
nistrari solent, ex sententia omniū medicorum
ad arthritidem frigidam curandam aptissima est
resina terebinthina, utpote quæ tum frigidam in-
temperiem tollit, tum redundantem humorem
eu vaporem discutit, eundemque prædurum e-
molliat. Sed quia terebinthina diureticum medi-
camentum est, ne ad vias vrinæ feratur potius, q̃
ad articulos affectos, propterea admiscendum ei
vehiculum aliquod, quod ipsam ab vrinæ vijs di-
uertat, ad articulos verò deducat; qualis est puluis
iuræ, nam alioquin licet fluentem ad articulos hu-
morem per vias vrinæ euacuet atque expurget,
non tamen humorem, qui confluit, discutit, du-
rumue emolliat, aut frigidam articulorum intem-
periem tollit. Terebinthinæ præter puluerē iuræ
commiscendum adhuc quidpiam aliud, cuius be-
neficio articulorum laxitatē corrigat; talis autem
remedij materia fuerit puluis ossiū humanorum
crematorum. Exempli gratia, & terebinthinæ li-
quidæ ʒ 4. pulueris iuræ, ossium humanorum cre-
matorum añ ʒ 1. misce & fiant pilulæ, quæ quoti-
die exhiberi possunt non solum ad ʒ 2. sed etiam
ad 3. aut 4. prout magis minúsve prædicta indicā-
tia in resinam terebinthinam agere videbuntur.
Probatur in arthritide frigida theriaca, qua au-
ctor libri de theriaca ad Pis. c. 15. non nisi post to-
tius corporis purgationem, tumorisq; articulorū
diminutione. n aliquam cōuenire docet, redun-

stante siquidem in toto corpore humore tumoreque articulorum nihil imminuto, theriaca facile redundantem humorem ad loca affecta deduxerit, ex quo tumor incrementum accipiat. Contra ubi vniuersum corpus fuerit expurgatum, tumorque sese remiserit, quod superest humoris redundantis theriacæ vi discutitur, locusque frigidus & humidus à contrario alteratur. Eandem vim habent mithridatica cōfectio & sal theriacalis, quorum trium dosis est à 35. ad 31. In arthritide frigida ligni guaiaci decoctum ab omnibus celebratur, præcipue verò quando arthritidis ex redundantibus humoribus virulentia venerea infectis producit. Sed quoniam decoctum guaiaci ut calidum tenuisque substantiæ, ex æquo in vniuersum corpus fertur, non magis autem ad articulos quam ad alias partes, idcirco optimum factum erit guaiaco admiscere iuam, stæchadem, trifaginem, & similia, quorum ope ad articulos maiore ex parte reducatur. Commendantur quoque olea destillata de spica, de baccis lauri, baccis hedere, ex granis ebuli, ex ligno guaiaco, è cera, ex ossibus crematis; quæ cum vehementissimè exsiccent, quædam etiam insigniter calefaciant, sunt permiscenda ad 2. aut 3. guttulas cum aliquo decocto frigidos articulorum tumores respiciente. Ijs namque notissimum est non tantum frigidam superari arthritidem, sed vel vno guaiaci oleo diurnam veneream virulentiam funditus extirpatam fuisse. Probandur Aetio aliisque pastilli ex vipera, geniana, aut hyperico: medicamentum ex æqualibus portionibus

tionibus aristolochiæ, gentianæ, baccarum lauri & mirræ, tetrapharmacum nuncupatū in hunc usum adhibetur. Nicolaus Alexandrinus scriptor Græcus libro de compos. medicam. c. 169. diatriō pipereon ad arthritidem frigidam maximè conferre testatur. Ad arthritidem verò calidam aquæ Virginis in agro Patanino, Calderij similiter aquæ in agro Veronensi quotidianæ experientiæ testimonio egregiè conferunt. Sic decoctū salsæ, dummodo ea, quodd flatulenta sit, cum discutiente aliquo permisceatur, vtpote cum aliqua portione guaiaci simulque cum vehiculo quopiam salsam ad articulos devehente, qualis est iua. Neque improbatur serum lactis caprini secundum Dioscoridem præparatum; eoque magis, si febris arthritidem comitetur. Hæc de materijs pharmaceuticis: nunc ad diætericas transeamus.

De Aere, cibo, & potu. Cap. 58.

Remediorum ad viuendi rationem attinētium materiæ ab aere, cibo, potu alijsque rebus nō naturalibus necessariò occurrentibus capiuntur. Aer frigidus arthritidi inutilis atque noxius est, quandoquidem catem condensat, qua constipata redundās humor plus iusto detinetur. Siccus verò aer quia materiam arthritidis effectricem absorbit, nullo non tempore vtilissimus est. Calidus item sæpe, nonnunquam etiam temperatus: hic in arthritide calida, ille in frigida. Itaque aer frigidus & humidus, qualis ferè hyemalis, ad calidum siccumque alterandus est ignis adminiculo, quæ admodum faciunt balneatores, collocatis agris

in cubiculis non longè ab hypocaufto, in quo statis horis quotidie sudor ijs excitandus, quousque magnam partem arthritidis materia cōsumatur. Galenus lib. 10 de faciliè parabilibus ad Glauc. c. 23. non solum ischiadicos, sed podagricos, alijsque articulorum morbis affectos omnes tenui victu esse nutriendos ostendit; quòd is eodemmet Galeno teste 4. aphor. 2. & 4. Meth. 6. materiæ copiam minuat, quæ nunquam non affectibus illis adest. Quoniam verò constat victus tenuis cibis vel paucis, vel parum nutrientibus, vt perhibet Galenus in commento quarti aphorismi primæ particulæ, idcirco vel pauci, vel parum nutriētes cibi omnibus arthriticis exhibendi. Hippocrates aphorismo p̄ximè citato morbis diuturnis, quales plerunque sunt articulorum morbi, tenuem victum tradit non conuenire; nihil tamē præcipit ab eo, quod nos iam diximus, alienum, quoniā Hippocrates de victu tenui, & constituto eò loci loquitur, hoc est, à principio morbi vsque ad statum semper tenui administrato; nos autem de victu, qui aliquando tenuis est exhibendus, nō semper: id quod accuratè intuitus Aetius tertio tetra- bilium sermone 4. c. 3. in exacerbationibus tantū dolorum articularium vtendum esse victu tenui confirmat; exacerbationum nomine statum, vltimamque augmenti partē complexus. Hanc sententiam in Hippocrate adinuenit prima apho. 11. quo loco in statu, & parum ante statum cibū esse subtrahendum docet. Optimè tamen monet Aetius ante exacerbationes ægrum esse nutriēdum, quod

quod eodem è loco desumpsit, subiiciente Hippocrate prius vberius esse nutriendum. neq; profectò abs re in initio, & prima parte morbi articularis victu reficiente opus est, quandoquidem his temporibus vena secatur, pharmaca item exhibentur. Dicit autem Hippocrates 2. aphor. 16. vbi famemes, laborandum non est, quibus verbis innuit eodem die, quo vtimur victu tenui, non esse secandam venam, aut purgationem moliendam; vicissim autem vbi purgandum, aut vena secanda, non esse vtendum victu famem excitante. Quare per intervalla nutriendi arthritici, vt rectè adnotauit Aetius, maximè quando vena pertundenda, aut pharmacum euacuans exhibendum. Idem cum Galeno in eo consentit, quòd victum attenuantem arthriticis accommodatum existimet; nam Galenus libro de attenuantis victus ratione ca. 1. vno se victu attenuante quāplutimas arthritides curasse constanter affirmat. Cibos arthritidi convenientes ibidem proponit Galenus, vt nobis nō sit necesse singulos enumerando percensere. Abstinentum est à carnibus crassæ, duræ valdeq; nutrientis substantiæ; probantur carnes pullorum, anium montanarum, columborum syluestrium; pisces saxatiles, & pisciculi saliti; inter fructus pasulæ dulces, pistachia, cappares, iuscula deniq; ex panico, milio, hordeo; quæ iuscula in arthritide frigida, nisi pyrethro, pipere, cinamomo, aut similibus condiantur, non videntur profutura, licet tenuis victus sint materiæ. Contrà ad arthritidem calidam per se sola citra alterius adiectionem

permultum conferunt. Panis ex farina triticea, cui aliquantulum fœniculi, cumini, aut anisorum immiscetur, accommodatissimus. Quod si bis coctus exhibeatur, minus adhuc nutrit, quamuis moderatè cocto minus attenuare, potiusque in crassos humores conuerti videatur, Galeno teste primo de alimētorum facultatibus c. 2. In arthritide calida prorsus a vino abstinendum, quod intemperiem calidam foueat, ac redundantem humorem ad affecta loca deducat. In arthritide frigida vino uti licebit tenui, albo, oligophoro, verū postidoneam totius corporis purgationem; antequam humoribus ad locum affectum deferendis sine cotrouersia vehiculo foret. Pro vino autem, quoties eo uti non licet, secunda decoctio guaiaci, vel salsæ vsurpanda.

De somno & vigilia, motu & quiete, excretionē & retentione, animique perturbationibus. Cap. 59.

Somnus moderatus confert, non multus, aut profundus, ut qui redundantis materiæ euacuationem prohibeat, caput repleat, fluxionemq; ad articulos exinde foueat. Quando verò præ doloris vehementia inmodicæ vigiliæ ægrum exhauriunt, conciliandus somnus tum stupefaciētibus, tum alimentis medicinalibus ad somnum inducendum aptis, qualia sunt succus amygdalarum dulcium, lactuca, & similia. Exercitium moderatum & opportunum prodest plurimum: immodica contrā, aut intempestiua exercitatio semper molesta. Imò multi nōdum arthritici, uti ex Hippocratis sententia in superioribus ostēdimus, ex nimia

inimia equitatione in ischiadem delapsi sunt. Ven-
nus arthritide laborantibus maximè noxia: qua de
causa scriptum reliquit Hippocrates, nec pueros,
nec eunuchos reperisse se podagricos. euacuatio-
nes conuenientes fouendæ, suppressæ verò reuo-
candæ, exempli gratia, expuitio masticatorijs fa-
miliaribus, per nares euacuatio errhinis, per po-
ros totius insensibiles instrumento sudorifico, vel
iure præcalido. Omnes animi perturbationes fu-
giendæ; nam quamuis dolorem articulare quod-
dammodo permulcere videantur, sua tamen mo-
lestia non carent, qua ægrum variè afficiant atque
afflicent. Alacritas animi contrà non potest non
prodesse, cum simplex sit anodynnon, facultatem
sensitiuam ab obiecti molesti perceptione distra-
hens, nullam secum ipsa molestiam afferens. At-
que hæc ad communem studiosorum vtilitatem
de arthritide cum cognoscenda, tum curanda;
quo in opusculo quid præstiterim, omnium rectè
sentientium esto iudicium.

FINIS.



